


レジメン登録名: 3-wPAC + CBDCA  
 登録番号: 肺-02  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.2	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.3	生食 パクリタキセル	500mL 200mg/m <sup>2</sup>	180min	
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: CDDP + GEM  
 登録番号: 肺-03  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	15min		Rp.2	生食	100mL
	デキサート	9.9mg		ジェムザール		1000mg/m <sup>2</sup>	
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A					
Rp.4	生食	100mL	30min				
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>					
Rp.5	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>					
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.7	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min				※Day1からイメンドを3日間内服する ※シスプラチンは遮光して投与する
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: CBDCA + GEM  
 登録番号: 肺-04  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 8			
Rp.1	生食 デキサート 5HT3RA	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	30min	Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	30min
Rp.3	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: GEM  
登録番号: 肺-07  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	30min

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 4週間

レジメン登録名: DOC(70)  
登録番号: 肺-12  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m <sup>2</sup>	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC + wCBDCA + CRT  
 登録番号: 肺-14  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1, 8, 15, 22, 29, 36				
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 9.9mg 20mg 5mg	10min	※イメンド使用時はDEXを6.6mgへ減量
Rp.2	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min	
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 40mg/m <sup>2</sup>	60min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 2	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

放射線2Gy/day x 30/6wks



レジメン登録名: CDDP + VNR + CRT (術前)  
 登録番号: 肺-18  
 対象癌種: 非小細胞肺癌  
 適応分類: 術前補助化学療法


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	KN3号	500mL	90min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食	500mL	90min				
Rp.3	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.2	KN3号	500mL	90min
Rp.4	生食 ナベルビン	50mL 15mg/m <sup>2</sup>	全開で	Rp.3	ヴィーンF	500mL	90min
Rp.5	生食	250mL	全開で	Rp.4	KN3号	500mL	90min
Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 80mg/m <sup>2</sup>	120min	Rp.5	ヴィーンF	500mL	90min
Rp.7	ヴィーンF	500mL	90min	Day 8			
Rp.8	KN3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.9	ヴィーンF	500mL	90min	Rp.2	生食 ナベルビン	50mL 15mg/m <sup>2</sup>	全開
				Rp.3	生食	250mL	全開

※Day1からイメンドを3日間内服する  
 ※シスプラチンは遮光して投与する


※CVポートから点滴する場合、  
 Rp.3は生食50mLに変更可能

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース3週間で2コース施行  
 RT: 40Gy/20fr



レジメン登録名: CDDP + PEM  
 登録番号: 肺-20  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	15min	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
Rp.4	生食	100mL	10min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>					
Rp.5	生食	100mL	30min				
Rp.6	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>					
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.8	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				

※パンピタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。

※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。


※Day1からイモンドを3日間内服する  
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース: 3週間






レジメン登録名: CBDCA + PEM  
 登録番号: 肺-21  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.2	生食 アリムタ	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10min
Rp.3	生食	50mL	フラッシュ
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min


※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。  
 ※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wPAC + CBDCA + BV  
 登録番号: 肺-24  
 対象癌種: 非小細胞肺がん (non-sq)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 15mg/kg	90min	
Rp.2	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.3	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min	※イメンド使用時はDEX9.9mgへ減量
Rp.4	生食 パクリタキセル	500mL 200mg/m <sup>2</sup>	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: CDDP + VNR + CRT  
 登録番号: 肺-26  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 局所進行癌 (Stage III)


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	15min	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
Rp.4	生食	50mL	全開で	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	ナベルビン	20mg/m <sup>2</sup>					
Rp.5	生食	250mL	全開で	Day 8			
Rp.6	生食	300mL	120min	Rp.1	生食	100mL	15min
	シスプラチン	80mg/m <sup>2</sup>		Rp.2	生食	50mL	全開
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min		ナベルビン	20mg/m <sup>2</sup>	
Rp.8	ソルデム3	500mL	90min	Rp.3	生食	250mL	全開
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				

※Day1からイメンドを3日間内服する  
 ※シスプラチンは遮光して投与する


※CVポートから点滴する場合、Rp.3は生食50mLに変更可能

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース4週間で2コース施行(最大3コース)  
 RT: 60Gy/30fr



レジメン登録名: CBDCA + PEM + BV  
 登録番号: 肺-29  
 対象癌種: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 15mg/kg	90min
Rp.2	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10min
Rp.4	生食	50mL	フラッシュ
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min

※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。


※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間 6コースまで



レジメン登録名： CDDP + PEM + BV  
 登録番号： 肺-30  
 対象癌種： 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)  
 適応分類： 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

	Day 1				Day 2, 3		
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	90min		デキサート	6.6mg	
	アバスチン	15mg/kg		Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
Rp.3	生食	500mL	90min	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	100mL		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
	デキサート	9.9mg	15min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A					
Rp.5	生食	100mL					
	アリムタ	500mg/m <sup>2</sup>	10min				
Rp.6	生食	100mL	30min				
Rp.7	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	75mg/m <sup>2</sup>					
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.9	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.10	ソルアセトF	500mL	90min				

※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。  
 ※メコバミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。

※Day1からイメンドを3日間内服する  
 ※シスプラチンは遮光して投与する


② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース: 3週間

4コースまで




レジメン登録名: wNabP + CBDCA  
 登録番号: 肺-32  
 対象癌種: 肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1				Day 8, 15		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min
Rp.3	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				

※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。  
 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivolumab  
登録番号: 肺-33  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 3 mg/kg	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




レジメン登録名: DOC+RAM  
 登録番号: 肺-34  
 対象癌種: 非小細胞肺癌  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


				Day 1		
Rp.1	生食	50mL	10min			
	デキサート	6.6mg				
	ポララミン	5mg				
Rp.2	生食	100mL	30min			
Rp.3	生食	250mL	60min			
	サイラムザ	10mg/kg				※0.2マイクロのフィルター付きルートを使用すること
Rp.4	生食	250mL	60min			
	ドセタキセル	60mg/m <sup>2</sup>				サイラムザ投与後は1時間の観察期間をもうけること (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間






レジメン登録名: Pembrolizumab  
登録番号: 肺-36  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezolizumab  
登録番号: 肺-37  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Atezolizumab	100mL 1200mg/body	30min (初回は60min) ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Durvalumab  
登録番号: 肺-38  
対象癌種: 非小細胞肺癌  
適応分類: 切除不能な局所進行  
根治的化学放射線療法後の維持療法

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Durvalumab	250mL 10 mg/kg	60min ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



化学放射線療法終了42日以内に開始すること  
最長で12ヶ月まで投与可能

レジメン登録名: Pembro + wNabP + CBDCA  
 登録番号: 肺-39  
 対象癌種: 肺がん  
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
	※フィルター付きルートを使用すること						
Rp.2	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min
Rp.3	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。			
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				

※day1からイメンドを3日間内服する。


※day1のアブラキサンはフィルターを回避するため側管から投与。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Pembro + PEM + CBDCA  
 登録番号: 肺-40  
 対象癌種: 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1			
Rp.1	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min	※キイトルーダはフィルター付きルートを使用すること。	
Rp.2	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	※day1からイメンドを3日間内服する。 ※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、 アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。	
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。	
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min	その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで 9週毎に筋注する。	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezo+3-wPAC+CBDCA+BV  
 登録番号: 肺-42  
 対象癌種: 非小細胞肺がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 テセントリク	250mL 1200mg	60min	※テセントリクは2回目以降30分に短縮可能 ※アバスチンは2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能
Rp.2	生食 アバスチン	100mL 15mg/kg	90min	
Rp.3	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.4	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min	
Rp.5	生食 パクリタキセル	500mL 200mg/m <sup>2</sup>	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.6	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezo + PEM + CBDCA  
 登録番号: 肺-44  
 対象癌種: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				
Rp.1	生食 テセントリク	250mL 1200mg	30min (初回60分)	※テセントリクはフィルター付きルートを使用すること。
Rp.2	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	※day1からイメンドを3日間内服する。
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m <sup>2</sup>	10min	※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、 アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 6	60min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。 その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで 9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: Atezo + wNabP + CBDCA  
 登録番号: 肺-46  
 対象癌種: 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く)  
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	生食 テセントリク	250mL 1200mg	30min (初回60分)	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
※フィルター付きルートを使用すること							
Rp.2	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min
Rp.3	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m <sup>2</sup>	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。			
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC6	60min				

※day1からイメンドを3日間で内服する。


※day1のアブラキサンはフィルターを回避するため側管から投与。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間






レジメン登録名: Pembrolizumab(6週毎)  
登録番号: 肺-47  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 400mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間




レジメン登録名: Nivolumab(4週毎)  
登録番号: 肺-48  
対象癌種: 非小細胞肺がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

