

レジメン登録名:

CDDP + CRT

登録番号:

子頸-01

対象癌種:

子宮頸がん


適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食	100mL	15min	
	デキサート	9.9mg		
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
Rp.2	生食	500mL	120min	※シスプラチンは遮光して投与する
	シスプラチン	35mg/m ²		
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min	
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min	


② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間

RT: 1.8Gy/25fra/45Gy



レジメン登録名:

CDDP + CPT-11

登録番号:

子頸-02

対象癌種:

子宮頸がん

適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	9.9mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.3	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.2	生食	500mL	90min
	生食	500mL	90min		トポテシン	60mg/m ²	
	トポテシン	60mg/m ²					
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min	※Day 1からアプレピタントを3日間内服する ※シスプラチンとトポテシンは遮光して投与する			
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: CDDP + CPT-11
 登録番号: 子頸-02
 対象癌種: 子宮頸がん
 適応分類: 術後・進行・再発


登録申請日: 2008.10.28
 登録申請者: 藤本 英夫
 診療科: 婦人科
 登録承認日: 2008.11.25
 登録更新日: 2023.12.25

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	9.9mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.2	生食	500mL	90min
	アロカリス	1V			トポテシン	60mg/m ²	
Rp.3	生食	500mL	90min				
	トポテシン	60mg/m ²					
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min				
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンとトポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



④ プレメディケーション

嘔吐リスク: 高度(day1)、中等度(day8, 15)

⑤ ポストメディケーション

Day4, 9-10, 16-17, デカドロン 8mg

⑥ 参考文献

Oncology. 2000;58(1):31-7.

レジメン登録名:

CPT-11 + MMC

登録番号:

子頸-03

対象癌種:

子宮頸がん

適応分類:


術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

	Day1			Day8, 15			
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.2	生食 マイトマイシン	50mL 10mg/m ²	全開で	Rp.2	生食 トポテシン	500mL 100mg/m ²	90min
Rp.3	生食 トポテシン	500mL 100mg/m ²	90min				


※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名:
登録番号:
対象癌種:
適応分類:

wCPT-11
子頸-08
子宮頸がん
術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	9.9mg	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.2	生食	500mL	90min
	トポテシン	100mg/m ²	※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: Pembr+3-wPAC+CBDCA+BV
 登録番号: 子頸-15
 対象癌種: 子宮頸癌
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食	100mL	30min	※アバステンは2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能
	キイトルーダ	200mg		
Rp.2	生食	50mL	10min	
	デキサート	9.9mg		
	ファモチジン	20mg		
	ポララミン	5mg		
Rp.3	生食	100mL	30min	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
Rp.4	生食	500mL	180min	
	パクリタキセル	175mg/m ²		
Rp.5	生食	250mL	60min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する ※Day1からアプレピタントを3日間内服する
	カルボプラチン	5AUC		
Rp.6	生食	100mL	90min	
	アバステン	15mg/kg		

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Pembro+3-wPAC+CDDP+BV
 登録番号: 子頸-20
 対象癌種: 子宮頸癌
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
	硫酸Mg補正液	0.5A			デキサート	6.6mg	
Rp.2	生食	100mL	30min	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
	キイトルーダ	200mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.3	生食	50mL		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
	デキサート	9.9mg	10min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	ファモチジン	20mg					
	ポララミン	5mg					
Rp.4	生食	100mL	30min				
	5-HT3拮抗薬	1A					
	アロカリス	1V					※アバスチンは2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能
Rp.5	生食	500mL	180min				
	パクリタキセル	175mg/m ²					※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.6	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	50mg/m ²	90min				※シスプラチンは遮光して投与する
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.8	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.10	生食	100mL	90min				
	アバスチン	15mg/kg					

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース:3週間

