


レジメン登録名: mFOLFOX6
 登録番号: 腸-02
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr

※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: FOLFIRI
 登録番号: 腸-03
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.3	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: mFOLFOX6 + BV
 登録番号: 腸-05
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 5mg/kg	90min	※アバスタチンは、2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可能
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.4	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min	
Rp.5	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: FOLFIRI + BV
 登録番号: 腸-06
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 アバスチン	100mL 5mg/kg	90min ※アバスチンは、2回目は60分、3回目以降は30分 まで短縮可能
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.4	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	90min ※トポテシンは遮光して投与する
Rp.5	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr ※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで


レジメン登録名: sLV5FU2
 登録番号: 腸-07
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.3	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.4	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr

※Rp.4はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: sLV5FU2+BV
 登録番号: 腸-08
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 アバステチン	100mL 5mg/kg	90min	※アバステチンは、2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可能
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: CPT-11 + S-1
 登録番号: 腸-14
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食	100mL	15min	
	デキサート	9.9mg		
	5-HT ₃ 拮抗剤	1A		
Rp.2	生食	500mL	90min	※トポテシンは遮光して投与する
	トポテシン	150mg/m ²		


② 投与方法



S-1 投与量 :		
BSA	1.25 m ² 未満	80 mg/day
	1.25 - 1.5 m ²	100 mg/day
	1.5 m ² 以上	120 mg/day

③ 投与スケジュール

1.5時間投与、1コース期間:3週間(S-1:2週投与・1週休薬)、総コース数:PDまで




レジメン登録名: wCPT-11
登録番号: 腸-20
対象癌種: 大腸がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT3拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.2	生食 CPT-11	500mL 100mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: XELOX
 登録番号: 腸-24
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	ゼローダ [®] 2000mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		


② 投与方法



体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²	3000		
1.41~1.51m ²		2400	
1.51~1.66m ²			1800
1.66~1.81m ²	3600		
1.81~1.96m ²		3000	
1.96~2.11m ²	4200		2400
2.11m ² 以上			

③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: XELOX + BV
 登録番号: 腸-26
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 アバステン	100mL 7.5mg/kg	90min	Rp.1	ゼローダ 2000mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		

※アバステンは、2回目は60分、3回目以降は30分まで短縮可能

体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²	3000		
1.41~1.51m ²		3600	2400
1.51~1.66m ²	4200		
1.66~1.81m ²		3000	3000
1.81~1.96m ²	2400		
1.96~2.11m ²			
2.11m ² 以上			


② 投与方法

BV 7.5mg/kg	L-OHP 130mg/m ²
----------------	-------------------------------



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Cape + BV
 登録番号: 腸-28
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 アバスチン	100mL 7.5mg/kg	90min	Rp.1	ゼローダ [®] 2000mg/m ² /day 1日2回


② 投与方法



体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²	3000		
1.41~1.51m ²		3600	2400
1.51~1.66m ²			
1.66~1.81m ²	4200	3000	2400
1.81~1.96m ²			
1.96~2.11m ²			
2.11m ² 以上			

③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: FOLFIRI+Cet
 登録番号: 腸-29
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発
 (K-ras野生型)

① 投与薬剤名と投与量

Day 1 (day8はRp.1-4のみ)


Rp.1	生食	50mL	10min	※デキサートは初回day1のみ16.5mg、以降day1は9.9mg、day8は6.6mgを投与
	デキサート	9.9mg		
Rp.2	生食	100mL	30min	※生食500mLから100mL抜いてアービタックスを混注
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
初回 Rp.3	生食	400mL	120min	※生食500mLから100mL抜いてアービタックスを混注
	アービタックス	400mg/m ²		
2回目以降 Rp.3	生食	250mL	60min	
	アービタックス	250mg/m ²		
Rp.4	生食	100mL	60min	
Rp.5	生食	250mL	120min	
	レボホリナート	200mg/m ²		
Rp.6	生食	250mL	90min	※トポテシンは遮光して投与する
	トポテシン	150mg/m ²		
Rp.7	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.8	生食	適量	46hr	
	5-FU (c.i.)	2400mg/m ²		※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで




レジメン登録名: 2-weekly CPT-11 + Pani
 登録番号: 腸-32
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発
 (K-ras野生型)

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 ベクティビックス	100mL 6mg/kg	60min	
Rp.2	生食	100mL	60min	※Rp.2は初回以降30分に短縮可能。
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	30min	※0.2 or 0.22μmインラインフィルターを有する輸液セットを用いること ※生食100mLのボトルから生食を必要量抜き取り、全量100mLとする
Rp.3	生食 トポテシン	500mL 150mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する


② 投与方法

※投与開始前、皮膚科に受診すること。
 皮膚科からはど瘡様皮疹に対する予防処方薬が出される。



③ 投与スケジュール

1コース: 2週間




レジメン登録名: CPT-11 + S-1 + BV
 登録番号: 腸-33
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 アバスチン	100mL 7.5mg/kg	90min	
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.3	生食 トポテシン	500mL 150mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する

② 投与方法




S-1 投与量:

BSA	1.25 m ² 未満	80 mg/day
	1.25 -1.5 m ²	100 mg/day
	1.5 m ² 以上	120 mg/day

③ 投与スケジュール

1コース期間:3週間(S-1:2週投与・1週休薬)、総コース数:PDまで



レジメン登録名: XELIRI
 登録番号: 腸-34
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食	100mL	15min	Rp.1	ゼローダ [®] 1600mg/m ² /day 1日2回
	デキサート	9.9mg			
	5-HT ₃ 拮抗剤	1A			
Rp.2	生食	500mL	90min		
	トポテシン	200mg/m ²			

体表面積	Capecitabine (1日用量)	
	初回投与量	減量段階1
1.31m ² 未満	1800	1200
1.31~1.64m ²	2400	1800
1.64m ² 以上	3000	2400

※トポテシンは遮光して投与する


※トポテシンは、UDP-グルクロン酸転移酵素 (UDP-glucuronosyltransferase, UGT) の2つの遺伝子多型 (UGT1A1 * 6、UGT1A1 * 28) について、いずれかをホモ接合体 (UGT1A1 * 6/* 6、UGT1A1 * 28/* 28) 又はいずれもヘテロ接合体 (UGT1A1 * 6/* 28) としてもつ患者では、重篤な副作用 (特に好中球減少) 発現の可能性が高くなることが報告されているため、減量を考慮すること。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: XELIRI + BV
 登録番号: 腸-35
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 アバステン	100mL 7.5mg/kg	90min	Rp.1	ゼローダ 1600mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		
Rp.3	生食 トポテシン	500mL 200mg/m ²	90min		

体表面積	Capecitabine (1日用量)	
	初回投与量	減量段階1
1.31m ² 未満	1800	1200
1.31~1.64m ²	2400	1800
1.64m ² 以上	3000	2400

※トポテシンは遮光して投与する


※トポテシンは、UDP-グルクロン酸転移酵素(UDP-glucuronosyltransferase, UGT)の2つの遺伝子多型(UGT 1A1 * 6、UGT1A1 * 28)について、いずれかをホモ接合体(UGT1A1 * 6/* 6、UGT1A1 * 28/* 28)又はいずれもヘテロ接合体(UGT1A1 * 6/* 28)としてもつ患者では、重篤な副作用(特に好中球減少)発現の可能性が高くなることが報告されているため、減量を考慮すること。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: mFOLFOX6 + Pani
 登録番号: 腸-36
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発(K-ras野生型)


① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ベクティビックス	100mL 6mg/kg	60min
Rp.2	生食	100mL	60min ※2回目以降は30分に短縮可能
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min ※イメド併用時はデキサートを4.95mgに減量
Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min ※Rp.4とRp.5は同時に投与する
Rp.5	5%ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min
Rp.6	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.7	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr ※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: FOLFIRI + Pani
 登録番号: 腸-38
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発(K-ras野生型)


① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ベクティビックス	100mL 6mg/kg	60min
Rp.2	生食	100mL	60min ※2回目以降は30分に短縮可能
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min ※イメンド併用時はデキサートを4.95mgに減量
Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min ※Rp.4とRp.5は同時に投与する
Rp.5	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	90min ※トポテシンは遮光して投与する
Rp.6	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.7	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr ※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



レジメン登録名: S-1 + BV
 登録番号: 腸-39
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 アバステン	100mL 7.5mg/kg	90min	Rp.1	TS-1 80-120mg/m ² /day 1日2回

TS-1投与量


BSA	1.25m ² 未満	80mg/body
	1.25-1.5m ²	100mg/body
	1.5m ² 以上	120mg/body

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: SOX + BV
 登録番号: 腸-40
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 アバステン	100mL 7.5mg/kg	90min	Rp.1	TS-1 80-120mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		

TS-1投与量


BSA	1.25m ² 未満	80mg/body
	1.25-1.5m ²	100mg/body
	1.5m ² 以上	120mg/body

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: sLV5FU2+ Pani
 登録番号: 腸-42
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発 (K-ras野生型)


① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ベクティビックス	100mL 6mg/kg	60min
Rp.2	生食	100mL	60min ※2回目以降は30分に短縮可能
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min ※イメンド併用時はデキサートを4.95mgに減量
Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.5	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr ※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: FOLFIRI + RAM
 登録番号: 腸-43
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 9.9mg 5mg	10min	※イメンド併用時はデキサートを4.95mgに減量
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 1A	30min	※0.2マイクロのフィルター付きルートを使用すること
Rp.3	生食 サイラムザ	250mL 8mg/kg	60min	※最初の2回は1時間の観察期間を置く
Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	※Rp.4とRp.5は同時に投与する
Rp.5	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する
Rp.6	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.7	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: UFT + UZEL + BV
 登録番号: 腸-44
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 15		Day 1-21 内服	
Rp.1	生食 アバサチン	100mL 5 mg/kg	90min	Rp.1	UFT 300mg/m ² /day 1日3回 8h毎 空腹時 UZEL 75mg/day 1日3回 8h毎 空腹時


② 投与方法



BSA	UFT	LV
< 1.17	300 mg	75 mg
1.17 – 1.49	400 mg	75 mg
1.50 – 1.83	500 mg	75 mg
1.83 <	600 mg	75 mg

③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: FOLFIRI + AFL
 登録番号: 腸-45
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 ザルトラップ	100mL 4mg/kg	60min	※ザルトラップは指定のフィルターを用いて投与すること。
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.4	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	90min	※トポテシンは遮光して投与する
Rp.5	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: TAS-102 + BV
 登録番号: 腸-46
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 15		Day 1-5 8-12 内服	
Rp.1	生食 アバスチン	100mL 5 mg/kg	90min	Rp.1	TAS-102 70 mg/m ² /day 1日2回


② 投与方法



体表面積(m ²)	初回基準量 (トリフルリジン相当量)
1.07未満	35mg/回(70mg/日)
1.07以上~1.23未満	40mg/回(80mg/日)
1.23以上~1.38未満	45mg/回(90mg/日)
1.38以上~1.53未満	50mg/回(100mg/日)
1.53以上~1.69未満	55mg/回(110mg/日)
1.69以上~1.84未満	60mg/回(120mg/日)
1.84以上~1.99未満	65mg/回(130mg/日)
1.99以上~2.15未満	70mg/回(140mg/日)
2.15以上	75mg/回(150mg/日)

③ 投与スケジュール

1コース期間:4週間



レジメン登録名: mFOLFOXIRI
 登録番号: 腸-47
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 切除不能

患者は慎重に選択し、適性投与基準を遵守すること。
 また、頻回に臨床検査を行い、患者状態を十分に把握すること。


① 投与薬剤名と投与量

Day 1


Rp.1	生食 デキサート アロキシ	100mL 9.9mg 1V	15min	※Day1-3にイメンド内服
Rp.2	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	60min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.4	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	

※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



1コース期間: 2週間
 総コース数: 最大12コース

レジメン登録名: mFOLFOXIRI+BV
 登録番号: 腸-48
 対象癌種: 大腸がん
 適応分類: 切除不能


患者は慎重に選択し、適性投与基準を遵守すること。
 また、頻回に臨床検査を行い、患者状態を十分に把握すること。

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 アバスチン	100mL 5mg/kg	90min (2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能)
Rp.2	生食 デキサート 5HT3RA	100mL 9.9mg 1A	15min ※Day1-3にイメド内服
Rp.3	生食 トポテシン	250mL 150mg/m ²	60min
Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.5	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr

※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



1コース期間: 2週間
 総コース数: 最大12コース