


レジメン登録名: DOC + CDDP + 5FU  
 登録番号: 頭頸-01  
 対象癌種: 頭頸部がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		メインルート Day 1-5		側管から Day 5-6		側管から Day 4		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750mg/m <sup>2</sup>	24hr			Rp.2	ソルデム3	500mL 90min
						Rp.3	生食	500mL 90min
						Rp.4	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬 アロカリス	100mL 15min 9.9mg 1A 1V
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min			Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 60min 60mg/m <sup>2</sup>
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min			Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 120min 70mg/m <sup>2</sup>
Rp.4	ヴィーンF	500mL	90min			Rp.7	ヴィーンF	500mL 90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min			Rp.8	ソルデム3	500mL 90min
Rp.6	ヴィーンF	500mL	90min			Rp.9	ヴィーンF	500mL 90min

※シスプラチンは遮光して投与する  
 ※ジーラスタを5-FU終了後24hのday7に投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール






レジメン登録名: DOC  
登録番号: 頭頸-03  
対象癌種: 頭頸部がん  
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m <sup>2</sup>	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: wPAC+Cet  
 登録番号: 頭頸-12  
 対象癌種: 頭頸部がん  
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15, 22, 29, 36,42			
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 16.5mg 5mg	10min	Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 16.5mg 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min	Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 アービタックス	500mL 400mg/m <sup>2</sup>	2hr	Rp.3	生食 アービタックス	250mL 250mg/m <sup>2</sup>	1hr
Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m <sup>2</sup>	1hr	Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m <sup>2</sup>	1hr

※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する


※Day42はRp4なし

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与  
 1コース期間: 7週間




レジメン登録名: Nivolumab  
登録番号: 頭頸-15  
対象癌種: 頭頸部がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発  
※プラチナ使用歴ある患者

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240 mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間








レジメン登録名: Nivolumab  
登録番号: 頭頸-19  
対象癌種: 頭頸部がん  
適応分類: 切除不能な進行・再発  
※プラチナ使用歴ある患者

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間





レジメン登録名: Pembrolizumab+5FU+CBDCA

登録番号: 頭頸-20

対象癌種: 頭頸部がん

適応分類: 進行・再発

### ① 投与薬剤名と投与量


		メインルート Day 1-4	
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 1000mg/m <sup>2</sup>	24hr
		側管から Day 1	
Rp.2	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min
Rp.3	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min

※Day 1からイメンドを3日間内服する  
※キイトルーダ・カルボプラチンは最大6コース投与可  
※それ以降はキイトルーダ維持療法へ

### ② 投与方法



### ③ 投与スケジュール




レジメン登録名: DOC + CDDP +5FU(day1TPF)  
 登録番号: 頭頸-22A  
 対象癌種: 頭頸部がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day 1-5				側管から Day 2-3			側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750mg/m <sup>2</sup>	24hr				Rp.2	ソルデム3 硫酸Mg補正液	500mL 0.5A	90min
							Rp.3	生食	500mL	90min
							Rp.4	生食 デキサート	100mL 9.9mg	15min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min				Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 60mg/m <sup>2</sup>	60min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min				Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m <sup>2</sup>	120min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min				Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min				Rp.8	ソルデム3	500mL	90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min

※シスプラチンは遮光して投与する  
 ※ジラスタを5-FU終了後24hのday7に投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: PCE  
 登録番号: 頭頸-23  
 対象癌種: 頭頸部癌  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Weekly			
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 9.9mg 20mg 5mg	10min		※デキサートは初回のみ16.5mg投与 ※アプレピタント併用時はデキサートは初回9.9mg 2コース目以降は4.95mgに減量
Rp.2	生食 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 1A	30min		
初回 Rp.3	生食 アービタックス	400mL 400mg/m <sup>2</sup>	120min		※生食500mLから100mL抜いてアービタックスを混注 ※初回はアービタックス後1時間観察必要
2回目以降 Rp.3	生食 アービタックス	250mL 250mg/m <sup>2</sup>	60min		
Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m <sup>2</sup>	60min		※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL 1.5AUC	60min		

② 投与方法

投与時間: 初回・・・6時間 2コース目以降: 4時間 アプレピタントありでも変わらず。  
 最大: 8コース



③ 投与スケジュール

毎週投与

