


レジメン登録名: EC  
 登録番号: 乳-02  
 対象癌種: 乳がん  
 適応分類: 術前・術後・再発転移

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 6.6mg 1A	15min	
Rp.2	生食 ファルモルピシンRTU デキサート	20mL 90mg/m <sup>2</sup> 3.3mg	全開	※生食100mLから80mL抜き取る
Rp.3	生食 エンドキサン	250mL 600mg/m <sup>2</sup>	30min	Day 2-4にジーラスタ投与


※Day1からイメンドを3日間内服する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wHER  
登録番号: 乳-06  
対象癌種: 乳がん  
適応分類: 術前・術後・転移再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min ※初回はRp.1を投与30分前にカロナール2錠を内服

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC  
 登録番号: 乳-07  
 対象癌種: 乳がん  
 適応分類: 術前・術後・再発転移

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15	
Rp.1	生食 デキサート ガスター ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m <sup>2</sup>	60min


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与  
 1コース期間: 3週間




レジメン登録名: DOC(75)  
登録番号: 乳-14  
対象癌種: 乳がん  
適応分類: 術前・術後・再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 75mg/m <sup>2</sup>	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wNabP  
登録番号: 乳-19  
対象癌種: 乳がん  
適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 260mg/m <sup>2</sup>	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC+PER+3-wHER  
 登録番号: 乳-28  
 対象癌種: HER2陽性乳がん  
 適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 8,15
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	60min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.3	生食 デキサート ファモチジン ボララミン	50mL 6.6mg 1A 5mg	10min	○
Rp.4	生食	100mL	30min	○
Rp.5	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m <sup>2</sup>	60min	○


※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服  
 ※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール


1コース期間: 3週間






レジメン登録名: T-DM1  
登録番号: 乳-30  
対象癌種: 乳がん  
適応分類: HER2陽性の  
手術不能又は再発乳癌

① 投与薬剤名と投与量




② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間






レジメン登録名: HAL+PER+3-wHER  
 登録番号: 乳-33  
 対象癌種: HER2陽性乳がん  
 適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 8
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	60min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可  ※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服	×
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	○
Rp.4	生食 ハラヴェン	20mL 1.4mg/m <sup>2</sup>	2~5分	○

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: PER+3-wHER  
 登録番号: 乳-34  
 対象癌種: 乳がん  
 適応分類: 術前・術後補助

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	60min 2回目以降は30minに短縮可
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可


※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezolizumab + wNabP  
登録番号: 乳-35  
対象癌種: 乳がん  
適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 260mg/m <sup>2</sup>	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間






レジメン登録名: T-Deruxtecan  
 登録番号: 乳-37  
 対象癌種: 乳癌  
 適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗剤	100 mL 9.9 mg 1 A	15min	
Rp.2	5% Tz T-Deruxtecan	100mL 5.4 mg/kg	90min	※イメンド追加の場合はデキサート4.95mg ※2回目以降は30分まで短縮可能 ※フィルター付きルートを使用すること ※要遮光

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

