


レジメン登録名: 3-wPAC + CBDCA
 登録番号: 原不-01
 対象癌種: 原発不明がん(腺癌)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------|--------|--|
| Rp.1 | 生食 デキサート ファモチジン ポララミン | 50mL 16.5mg 20mg 5mg | 10min | |
| Rp.2 | 生食 5-HT ₃ 拮抗薬 | 100mL 1A | 30min | |
| Rp.3 | 生食 パクリタキセル | 500mL 200mg/m ² | 180min | ※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する |
| Rp.4 | 生食 カルボプラチン | 250mL 6AUC | 60min | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: DOC + CBDCA
 登録番号: 原不-02
 対象癌種: 原発不明がん(腺癌)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| Day1 | | | |
|------|-----------------------|---------------------|-------|
| Rp.1 | 生食 | 100mL | 15min |
| | デキサート | 9.9mg | |
| | 5-HT ₃ 拮抗薬 | 1A | |
| Rp.2 | 生食 | 250mL | 60min |
| | ドセタキセル | 60mg/m ² | |
| Rp.3 | 生食 | 250mL | 60min |
| | カルボプラチン | AUC 6 | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間




レジメン登録名: DOC + CDDP + 5FU
 登録番号: 原不-03
 対象癌種: 原発不明がん(扁平上皮がん)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

| メインルート Day 1-5 | | | | 側管から Day 1 | | | |
|-------------------|-------------|--------------------------------|-------|---------------|--------------|------------------------------|--------|
| Rp.1 | 生食 5-FU | 1000mL 750mg/m ² | 24hr | Rp.2 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| | | | | Rp.3 | 生食 | 500mL | 90min |
| | | | | Rp.4 | 生食 デキサート | 100mL 9.9mg | 15min |
| | | | | Rp.5 | 生食 ドセタキセル | 250mL 60mg/m ² | 60min |
| Rp.2 | 生食 デキサート | 100mL 6.6mg | 15min | Rp.6 | 生食 シスプラチン | 300mL 70mg/m ² | 120min |
| Rp.3 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | Rp.7 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| Rp.4 | ソルアセトF | 500mL | 90min | Rp.8 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| Rp.5 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | Rp.9 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| Rp.6 | ソルアセトF | 500mL | 90min | | | | |

※シスプラチンは遮光して投与する
 ※イメンドをday1から3日間内服する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

