


レジメン登録名: GEM  
登録番号: 膝-01  
対象癌種: 膵がん  
適応分類: 術後・進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15	
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	6.6mg	
Rp.2	生食	100mL	30min
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>	

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 4週間

レジメン登録名: GEM+S-1  
 登録番号: 膝-02  
 対象癌種: 膝がん  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1, 8		Day 1-14	
Rp.1	生食	100mL	15min	TS-1投与量	
	デキサート	6.6mg		BSA	1.25m <sup>2</sup> 未満 60mg/body/day
Rp.2	生食	100mL	30min	1.25-1.5m <sup>2</sup>	80mg/body/day
	ジェムザール	1000mg/m <sup>2</sup>		1.5m <sup>2</sup> 以上	100mg/body/day

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: GEM+Erlotinib  
 登録番号: 膝-04  
 対象癌種: 膵がん  
 適応分類: 切除不能な膵癌

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1, 8, 15		Day 1-28
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	タルセバ 100mg/day
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	30min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: mFOLFIRINOX  
 登録番号: 膝-05  
 対象癌種: 膝がん  
 適応分類: 切除不能

患者は慎重に選択し、適性投与基準を遵守すること。  
 また、頻回に臨床検査を行い、患者状態を十分に把握すること。


① 投与薬剤名と投与量

Day 1


Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	※Day1-3にイメンド内服
Rp.2	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m <sup>2</sup>	120min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m <sup>2</sup>	120min	
Rp.4	生食 トポテシン	250mL 150mg/m <sup>2</sup>	90min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m <sup>2</sup>	46hr	

※Rp.6はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



1コース期間: 2週間  
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: wNabP + wGEM  
 登録番号: 膀-10  
 対象癌種: 膀がん  
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1,8,15	
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	50mL 6.6mg 1A	15min
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 125mg/m <sup>2</sup>	30min
Rp.3	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	30min

※アブラキサンの溶解時の濃度は5mg/mL厳守とする。


※アルブミン製剤使用の同意書が必要。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4 週間




レジメン登録名: nal-IRI + 5-FU + LV  
 登録番号: 膝-13  
 対象癌種: 膵がん  
 適応分類: 化学療法歴のある切除不能

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	※イメンド使用時はDEXを4.95mgへ減量する事
Rp.2	5% ブドウ糖液 オニバイド	500mL 70mg/m <sup>2</sup>	90min	
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m <sup>2</sup>	120min	
Rp.4	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m <sup>2</sup>	46hr	※Rp.4はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



1コース期間: 2週間  
 総コース数: PDまで