


レジメン登録名: CDDP + GEM
 登録番号: 肺-03
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 8			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	生食	100mL	30min
	デキサート	9.9mg			ジェムザール	1000mg/m ²	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A					
	アロカリス	1V					
Rp.4	生食	100mL	30min				
	ジェムザール	1000mg/m ²					
Rp.5	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	80mg/m ²					
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.7	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min				
Day 2, 3							
Rp.1	生食	100mL	15min				
	デキサート	6.6mg					
Rp.2	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: CBDCA + GEM
 登録番号: 肺-04
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 8			
Rp.1	生食 デキサート 5HT3RA	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min	Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min
Rp.3	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: GEM
登録番号: 肺-07
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min

② 投与方法



③ 投与スケジュール




1コース期間: 4週間

レジメン登録名: DOC(70)
登録番号: 肺-12
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC + wCBDCA + CRT
 登録番号: 肺-14
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1, 8, 15, 22, 29, 36				
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 9.9mg 20mg 5mg	10min	※イメンド使用時はDEXを6.6mgへ減量
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 40mg/m ²	60min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 2	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

放射線2Gy/day x 30/6wks




レジメン登録名: CDDP + VNR + CRT (術前)
 登録番号: 肺-18
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 術前補助化学療法

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	KN3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	KN3号	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ヴィーンF	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.4	KN3号	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.5	ヴィーンF	500mL	90min
Rp.4	生食	50mL	全開で	Day 8			
	ナベルビン	15mg/m ²					
Rp.5	生食	250mL	全開で	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.6	生食	300mL	120min	Rp.2	生食	50mL	全開
	シスプラチン	80mg/m ²			ナベルビン	15mg/m ²	
Rp.7	ヴィーンF	500mL	90min	Rp.3	生食	250mL	全開
Rp.8	KN3号	500mL	90min	※CVポートから点滴する場合、Rp.3は生食50mLに変更可能			
Rp.9	ヴィーンF	500mL	90min				


※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース3週間で2コース施行
 RT: 40Gy/20fr



レジメン登録名: CDDP + PEM
 登録番号: 肺-20
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 2, 3			
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	15min	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3	500mL	90min
Rp.4	生食	100mL	10min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	アリムタ	500mg/m ²					
Rp.5	生食	100mL	30min				
Rp.6	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	75mg/m ²					
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.8	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min				

※パンピタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。

※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。


※Day1からイモンドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース: 3週間




レジメン登録名: CBDCA + PEM
 登録番号: 肺-21
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	
Rp.2	生食 アリムタ	100mL 500mg/m ²	10min	※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。
Rp.3	生食	50mL	フラッシュ	
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wPAC + CBDCA + BV
 登録番号: 肺-24
 対象癌種: 非小細胞肺がん (non-sq)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 15mg/kg	90min	
Rp.2	生食 デキサート ファモチジン ポラミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.3	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	※イメンド使用時はDEX9.9mgへ減量
Rp.4	生食 パクリタキセル	500mL 200mg/m ²	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: CBDCA + PEM + BV
 登録番号: 肺-29
 対象癌種: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 15mg/kg	90min
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m ²	10min
Rp.4	生食	50mL	フラッシュ
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min

※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。


※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間 6コースまで




レジメン登録名: wNabP + CBDCA
 登録番号: 肺-32
 対象癌種: 肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1				Day 8, 15		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min
Rp.3	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				

※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。
 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 肺-33
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 3 mg/kg	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




レジメン登録名: Pembrolizumab
登録番号: 肺-36
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezolizumab
登録番号: 肺-37
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Atezolizumab	100mL 1200mg/body	30min (初回は60min) ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Durvalumab
登録番号: 肺-38
対象癌種: 非小細胞肺癌
適応分類: 切除不能な局所進行
根治的化学放射線療法後の維持療法

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Durvalumab	250mL 10 mg/kg	60min ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




化学放射線療法終了42日以内に開始すること
最長で12ヶ月まで投与可能

レジメン登録名: Pembro + PEM + CBDCA
 登録番号: 肺-40
 対象癌種: 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1			
Rp.1	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min	※キイトルーダはフィルター付きルートを使用すること。	
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	※day1からイメドを3日間内服する。 ※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。	
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m ²	10min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。	
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min	その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezo+3-wPAC+CBDCA+BV
 登録番号: 肺-42
 対象癌種: 非小細胞肺がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食	250mL	60min	※テセントリクは2回目以降30分に短縮可能 ※アバスチンは2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可能
	テセントリク	1200mg		
Rp.2	生食	100mL	90min	
	アバスチン	15mg/kg		
Rp.3	生食	50mL	10min	
	デキサート	16.5mg		
	ファモチジン	20mg		
	ポララミン	5mg		
Rp.4	生食	100mL	30min	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
Rp.5	生食	500mL	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
	パクリタキセル	200mg/m ²		
Rp.6	生食	250mL	60min	
	カルボプラチン	6AUC		

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezo + PEM + CBDCA
 登録番号: 肺-44
 対象癌種: 非小細胞肺癌(扁平上皮がんを除く)
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				
Rp.1	生食 テセントリク	250mL 1200mg	30min (初回60分)	※テセントリクはフィルター付きルートを使用すること。
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	※day1からイメンドを3日間内服する。
Rp.3	生食 アリムタ	100mL 500mg/m ²	10min	※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、 アリムタ最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 6	60min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。 その後、アリムタ投与期間中および投与中止後22日目まで 9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: Atezo + wNabP + CBDCA
 登録番号: 肺-46
 対象癌種: 非小細胞肺がん(扁平上皮がんを除く)
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	生食 テセントリク	250mL 1200mg	30min (初回60分)	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
※フィルター付きルートを使用すること							
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	15min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min
Rp.3	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。			
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC6	60min				

※day1からイメンドを3日間で内服する。


※day1のアブラキサンはフィルターを回避するため側管から投与。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Pembrolizumab(6週毎)
登録番号: 肺-47
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 400mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間




レジメン登録名: Nivolumab(4週毎)
登録番号: 肺-48
対象癌種: 非小細胞肺がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: Nivo+Ipi+PEM+CBDCA
 登録番号: 肺-50
 対象癌種: 非扁平上皮肺がん
 適応分類: 進行・再発の1次治療

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1, 22*		
Rp.1	生食 オプジーボ	100mL 360mg	30min	
Rp.2	生食	100mL	30min	
Rp.3	生食 ヤーボイ	20mL 1mg/kg	30min	* Day22はヤーボイ抜き ※フィルター付きルートを使用すること ※ヤーボイは生食50から30mLを抜き、必要量を混注すること (1-4mg/mLを確保するため) ※ヤーボイ観察期間のため前投薬は30分かけて投与
Rp.5	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 4.95mg 1A	30min	
Rp.6	生食 アリムタ	100mL 500mg/m ²	10min	※day1-3, day22-24はアプレピタントカプセルセット内服 ※投与開始7日前にメコバラミン2A筋注し、パンビタン末内服開始
Rp.7	生食 カルボプラチン	250mL 5AUC	60min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間 1コース後 Nivo + Ipi メンテナンスへ移行




レジメン登録名: Nivo + Ipi
 登録番号: 肺-51
 対象癌種: 肺癌
 適応分類: Nivo+Ipi+chemoのメンテナンス
 悪性中皮腫

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 22		
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 360mg	30min	生食 Nivolumab	100mL 360mg	30min
Rp.2	生食	100mL	30min			
Rp.3	生食 Ipilimumab	20mL 1mg/kg	30min			


※フィルター付きルートを使用すること
 ※Ipilimumabは生食30mLを抜いてから必要量を混注すること
 (1-4mg/mLを確保するため)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間




レジメン登録名: Erlotinib + RAM
 登録番号: 肺-52
 対象癌種: 肺がん
 適応分類: EGFR変異陽性の進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 6.6mg 5mg	10min	Erlotinib 150mg/dayで連日投与 Gefitinib 250mg/dayでも可
Rp.2	生食	100mL	30min	※サイラムザ投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する
Rp.3	生食 サイラムザ	250mL 10mg/kg	60min	サイラムザ投与後は1時間の観察期間をもうけること (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: Dur+Tre+wNabP+CBDCA(1-4コース用)
 登録番号: 肺-55
 対象癌種: 非小細胞肺癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				day 8, 15			
Rp.1	生食 イジユド	50mL 75mg	60min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食	100mL	60min	Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min
Rp.3	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min		※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。 ※アルブミン製剤使用の同意書が必要。		
Rp.4	生食 デキサート グラニセトロン	50mL 4.95mg 3mg	15min				
Rp.6	生食 アブラキサン	必要量 100mg/m ²	30min				
Rp.7	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				

※Day1からアプレピタントを3日間内服する
 ※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与
 ※イジユド、イミフィンジは0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用
 ※イジユド後生食は2回目以降フラッシュ可
 ※アブラキサンはフィルターを通さないこと


② 投与方法

Tre 75mg	生食 100mL	Dur 1500mg	前投薬	NabP 100mg/m ²	CBDCA 6AUC
-------------	-------------	---------------	-----	------------------------------	---------------



③ 投与スケジュール

4コース終了後、3週後に5コース目としてイミフィンジ単独、更に4週後に6コース目としてイミフィンジ+イジユド併用投与あり。



(day)

レジメン登録名: Dur+Tre+PEM+CBDCA(1-4コース用)
 登録番号: 肺-57
 対象癌種: 非小細胞肺癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 イジユド	50mL 75mg	60min	
Rp.2	生食	100mL	60min	
Rp.3	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min	※Day1からアプレピタントを3日間で内服する ※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与
Rp.4	生食 デキサート グラニセロン	50mL 4.95mg 3mg	15min	※イジユド、イミフィンジは0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用 ※イジユド後生食は2回目を以降フラッシュ可
Rp.6	生食 ペトレキセド	100mL 500mg/m ²	10min	※パンピタン末1gをday1の7日前から内服開始し、最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。
Rp.7	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min	※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。 • その後、ペトレキセド投与期間中および投与中止後22日目まで • 9週毎に筋注する。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

最初の4コースは1コース3週間。4コース終了後、3週後に5コース目としてイミフィンジ単独、更に4週後に6コース目としてイミフィンジ+イジユド併用投与あり。




レジメン登録名: Dur+Tre+PEM+CBDCA(5-6コース目)
 登録番号: 肺-58
 対象癌種: 非小細胞肺癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 29			
Rp.1	生食	250mL	60min	Rp.1	生食	50mL	60min
	イミフィンジ	1500mg			イジユド	75mg	
Rp.2	生食	50mL	15min	Rp.2	生食	250mL	60min
	デキサート	6.6mg			イミフィンジ	1500mg	
Rp.3	生食	100mL	10min	Rp.3	生食	100mL	15min
	ペムトレキセド	500mg/m ²			デキサート	6.6mg	
				Rp.4	生食	100mL	10min
					ペムトレキセド	500mg/m ²	

※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与
 ※イジユド、イミフィンジは0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用
 ※パンビタン末1gをday1の7日前から内服開始し、最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。
 ※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、ペムトレキセド投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。


② 投与方法



③ 投与スケジュール

イジユドは6コース目(計5回)で終了、
 その後はイミフィンジ+ペムトレキセド(4週毎)メンテナンスへ移行

1コース: 4週間



レジメン登録名: Dur+PEM(メンテナンス)

登録番号: 肺-59

対象癌種: 非小細胞肺癌 進行・再発

適応分類: Dur+Tre+PEM+CBDCAの7コース目以降として

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.3	生食 ペムトレキセド	100mL 500mg/m ²	10min


※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与

※イミフィンジは0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用

※パンプタン末1gをday1の7日前から内服開始し、最終投与日から22日目まで可能な限り継続する。

※メコバラミン注1mgをday1の7日前に筋注する。その後、ペムトレキセド投与期間中および投与中止後22日目まで9週毎に筋注する。


② 投与方法



③ 投与スケジュール

イジユドは6コース目(計5回)で終了、

7コース目以降はイミフィンジ+ペムトレキセド(4週毎)メンテナンスへ移行




レジメン登録名: Dur+Tre+GEM+CBDCA(1-4コース用)
 登録番号: 肺-60
 対象癌種: 非小細胞肺癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				day 8			
Rp.1	生食 イジユド	50mL 75mg	60min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食	100mL	60min				
Rp.3	生食 イミフィンジ	250mL 1500mg	60min	Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min
Rp.4	生食 デキサート グラニセトロン	50mL 4.95mg 3mg	15min				
Rp.6	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min				
Rp.7	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				


※Day1からアプレピタントを3日間内服する
 ※イミフィンジは体重30kg以下では、20mg/kgで投与
 ※イジユド、イミフィンジは0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用
 ※イジユド後の生食は2回目以降フラッシュ可

② 投与方法



③ 投与スケジュール

4コース終了後、3週後に5コース目としてイミフィンジ単独、更に4週後に6コース目としてイミフィンジ+イジユド併用投与あり。



レジメン登録名: Durvalumab

登録番号: 肺-62

対象癌種: 非小細胞肺がん 進行・再発


適応分類:
・Dur+Tre+wNabP+CBDCAの7コース目以降として
・Dur+Tre+GEM+CBDCAの7コース目以降として
・根治的化学放射線療法後の維持療法

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食	250mL	
	イミフィンジ	1500mg	60min
		or	
		20mg/kg: 体重: 30kg以下	


※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: T-Deruxtecan
登録番号: 肺-65 T-Deruxtecan
対象癌種: 肺癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		検査: オンコマインorパネル
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100 mL 9.9 mg 1 A	15min	
Rp.2	5% Tz T-Deruxtecan	100mL 5.4 mg/kg	90min	※アプレピタント追加の場合はデキサート4.95mg ※2回目以降は30分まで短縮可能 ※フィルター付きルートを使用すること ※要遮光

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

