


レジメン登録名: G-T-Deruxtecan
 登録番号: 胃-38
 対象癌種: 胃癌
 適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

| | | Day 1 | |
|------|-----------------------|-----------|-------|
| Rp.1 | 生食 | 100 mL | 15min |
| | デキサート | 9.9 mg | |
| | 5-HT ₃ 拮抗剤 | 1 A | |
| Rp.2 | 5% Tz | 100 mL | 90min |
| | T-Deruxtecan | 6.4 mg/kg | |


※アプレピタント追加の場合はデキサート4.95mg
 ※2回目以降は30分まで短縮可能
 ※フィルター付きルートを使用すること
 ※要遮光

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 胃-39
対象癌種: 胃癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|-----------------|---------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Nivolumab | 100mL 480mg/body | 60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: S-1 + CDDP
 登録番号: 胃-01
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| Day 8 | | | | Day 9, 10 | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| Rp.1 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | Rp.1 | 生食 | 100mL | 15min |
| Rp.2 | 生食 | 500mL | 90min | | デキサート | 6.6mg | |
| Rp.3 | 生食 | 100mL | 15min | Rp.2 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| | デキサート | 9.9mg | | Rp.3 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| | 5-HT ₃ 拮抗薬 | 1A | | Rp.4 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| Rp.4 | 生食 | 300mL | 120min | Rp.5 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | | | | | |
| Rp.5 | ソルアセトF | 500mL | 90min | | | | |
| Rp.6 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | | | | |
| Rp.7 | ソルアセトF | 500mL | 90min | | | | |

※シスプラチンは遮光して投与する
 ※Day8からイメンドを3日間内服する。

Day 1 - 21


| S-1 | BSA | |
|-----|------------------------|----------------|
| | 1.25m ² 未満 | 80mg/body/day |
| | 1.25-1.5m ² | 100mg/body/day |
| | 1.5m ² 以上 | 120mg/body/day |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間




レジメン登録名: S-1 + DOC
 登録番号: 胃-02
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | Day 1 | | | Day 1 - 14 | | |
|------|--------------|------------------------------|-------|------------|--|---|
| Rp.1 | 生食 デキサート | 100mL 6.6mg | 15min | S-1 | BSA 1.25m ² 未満 1.25-1.5m ² 1.5m ² 以上 | 80mg/body/day 100mg/body/day 120mg/body/day |
| Rp.2 | 生食 ドセタキセル | 250mL 40mg/m ² | 60min | | | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: S-1 + PAC
 登録番号: 胃-03
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | Day 1,8 | | | Day 1 - 14 | | |
|------|--|---------------------|-------|--|------------------------|----------------|
| Rp.1 | 生食 | 50mL | 10min | S-1 | BSA | |
| | デキサート | 6.6mg | | | 1.25m ² 未満 | 80mg/body/day |
| | ファモチジン | 20mg | | | 1.25-1.5m ² | 100mg/body/day |
| | ※パクリタキセル点滴30分前にペナ5錠内服 またはRp.1にポララミン 5mg追加 | | | | 1.5m ² 以上 | 120mg/body/day |
| Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min | ※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する | | |
| Rp.3 | 生食 | 250mL | 60min | | | |
| | パクリタキセル | 50mg/m ² | | | | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: S-1 + CPT-11
 登録番号: 胃-15
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | Day 1, 15 | | | Day 1 - 21 | | |
|------|-----------------------|---------------------|-------|------------|------------------------|----------------|
| Rp.1 | 生食 | 100mL | 15min | S-1 | BSA | |
| | デキサート | 9.9mg | | | 1.25m ² 未満 | 80mg/body/day |
| | 5-HT ₃ 拮抗薬 | 1A | | | 1.25-1.5m ² | 100mg/body/day |
| Rp.2 | 生食 | 500mL | 90min | | 1.5m ² 以上 | 120mg/body/day |
| | トポテシン | 80mg/m ² | | | | |
| | ※遮光して投与する | | | | | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間




レジメン登録名: CapeOX
 登録番号: 胃-27
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

| | | Day 1 | | Day 1-14 内服 | |
|------|--|-------------------------------|-------|-------------|--|
| Rp.1 | 生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 ※イモンド併用時はデキサートを4.95mgへ減量する | 100mL 9.9mg 1A | 15min | Rp.1 | ゼローダ 2000mg/m ² /day 1日2回 |
| Rp.2 | 5%ブドウ糖液 エルプラット | 500mL 130mg/m ² | 2hr | | |


② 投与方法



| 体表面積 | Capecitabine(1日用量) | | |
|-------------------------|--------------------|-------|-------|
| | 初回投与量 | 減量段階1 | 減量段階2 |
| 1.36m ² 未満 | 2400 | 1800 | 1200 |
| 1.36~1.41m ² | | | |
| 1.41~1.51m ² | 3000 | 2400 | 1800 |
| 1.51~1.66m ² | | | |
| 1.66~1.81m ² | 3600 | 3000 | 1800 |
| 1.81~1.96m ² | | | |
| 1.96~2.11m ² | 4200 | 3000 | 1800 |
| 2.11m ² 以上 | | | |
| | | | 2400 |

③ 投与スケジュール

1コース期間:3週間




レジメン登録名: G-SOX
 登録番号: 胃-29
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | | Day 1-14 内服 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-------------------------------|-------|--|--|---------|--|--|-----|-----------------------|-----------|--|------------------------|------------|--|----------------------|------------|
| Rp.1 | 生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 ※イモド併用時はデキサートを4.95mgへ減量する | 100mL 9.9mg 1A | 15min | Rp.1 | TS-1 80mg/m ² /day 1日2回 | | | | | | | | | | | | |
| Rp.2 | 5%ブドウ糖液 エルプラット | 500mL 100mg/m ² | 2hr | <table border="1"> <tr> <td colspan="3">TS-1投与量</td> </tr> <tr> <td>BSA</td> <td>1.25m²未満</td> <td>80mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.25-1.5m²</td> <td>100mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5m²以上</td> <td>120mg/body</td> </tr> </table> | | TS-1投与量 | | | BSA | 1.25m ² 未満 | 80mg/body | | 1.25-1.5m ² | 100mg/body | | 1.5m ² 以上 | 120mg/body |
| TS-1投与量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BSA | 1.25m ² 未満 | 80mg/body | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.25-1.5m ² | 100mg/body | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.5m ² 以上 | 120mg/body | | | | | | | | | | | | | | | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間:3週間



レジメン登録名: wPAC+RAM
 登録番号: 胃-31
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発
 使用期限:

① 投与薬剤名と投与量


| | Day 1,15 | | | | Day 8 | | |
|------|----------|---------------------|-------|------|---------|---------------------|-------|
| Rp.1 | 生食 | 50mL | 10min | Rp.1 | 生食 | 50mL | 10min |
| | デキサート | 6.6mg | | | デキサート | 6.6mg | |
| | ファモチジン | 20mg | | | ファモチジン | 20mg | |
| | ポララミン | 5mg | | | ポララミン | 5mg | |
| Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min | Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min |
| Rp.3 | 生食 | 250mL | 60min | Rp.3 | 生食 | 250mL | 60min |
| | サイラムザ | 8mg/kg | | | パクリタキセル | 80mg/m ² | |
| Rp.4 | 生食 | 250mL | 60min | | | | |
| | パクリタキセル | 80mg/m ² | | | | | |

※サイラムザとパクリタキセルの間に1時間の観察期間をもうけること
 (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)

※サイラムザ、パクリタキセル投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する


② 投与方法

※RAVIはDay1,15のみ



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間 PDまで



レジメン登録名: G-DCS
 登録番号: 胃-33
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

| Day 8 | | | | Day 9, 10 | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|--------|-----------|--------|-------|-------|
| Rp.1 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | Rp.1 | 生食 | 100mL | 15min |
| Rp.2 | 生食 | 500mL | 90min | | デキサート | 6.6mg | |
| Rp.3 | 生食 | 100mL | 15min | Rp.2 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| | デキサート | 9.9mg | | Rp.3 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| | 5-HT ₃ 拮抗薬 | 1A | | Rp.4 | ソルデム3号 | 500mL | 90min |
| Rp.4 | 生食 | 300mL | 60min | Rp.5 | ソルアセトF | 500mL | 90min |
| | ドセタキセル | 60mg/m ² | | | | | |
| Rp.5 | 生食 | 300mL | 120min | | | | |
| | シスプラチン | 60mg/m ² | | | | | |
| Rp.6 | ソルアセトF | 500mL | 90min | | | | |
| Rp.7 | ソルデム3号 | 500mL | 90min | | | | |
| Rp.8 | ソルアセトF | 500mL | 90min | | | | |

※シスプラチンは遮光して投与する
 ※Day8からイメンドを3日間内服する。


| Day 1 - 14 | | | |
|------------|------------------------|----------------|--|
| S-1 | BSA | | |
| | 1.25m ² 未満 | 80mg/body/day | |
| | 1.25-1.5m ² | 100mg/body/day | |
| | 1.5m ² 以上 | 120mg/body/day | |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 胃-34
対象癌種: 胃癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


| | | Day 1 | |
|------|-----------------|------------------|-------------------------------|
| Rp.1 | 生食 Nivolumab | 100mL 3 mg/kg | 60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: wNabP+RAM
 登録番号: 胃-35
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発
 使用期限:


① 投与薬剤名と投与量

| | Day 1,15 | | | | Day 8 | | |
|------|----------|----------------------|-------|------|--------|----------------------|-------|
| Rp.1 | 生食 | 50mL | 10min | Rp.1 | 生食 | 100mL | 15min |
| | デキサート | 6.6mg | | | デキサート | 6.6mg | |
| | ポララミン | 5mg | | Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min |
| Rp.2 | 生食 | 100mL | 30min | | アブラキサン | 100mg/m ² | |
| Rp.3 | 生食 | 250mL | 60min | | | | |
| | サイラムザ | 8mg/kg | | | | | |
| Rp.4 | 生食 | 100mL | 30min | | | | |
| | アブラキサン | 100mg/m ² | | | | | |

サイラムザとアブラキサンの間に1時間の観察期間をもうけること
 (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)


※サイラムザ投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間 PDまで



レジメン登録名: G-SOX + HER
 登録番号: 胃-36
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: HER2陽性の進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

| | Day 1 | | | Day 1-14 内服 | | |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|------|--------------------------------------|
| Rp.1 | 生食 ハーセプチン | 250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目移行) | 90min | Rp.1 | TS-1 | 80-120mg/m ² /day 1日2回 |
| Rp.2 | 生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 | 100mL 9.9mg 1A | 15min | | | |
| Rp.3 | 5%ブドウ糖液 エルプラット | 500mL 130mg/m ² | 2hr | | | |

TS-1投与量

| | | |
|-----|------------------------|------------|
| BSA | 1.25m ² 未満 | 80mg/body |
| | 1.25-1.5m ² | 100mg/body |
| | 1.5m ² 以上 | 120mg/body |

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

