


レジメン登録名: 補助FP(800/80)
 登録番号: 食道-01
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 術前補助療法

① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-5				側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 800mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
				Rp.3	生食	500mL	90min
				Rp.4	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬 アロカリス	100mL 9.9mg 1A 1V	30min
				Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 80mg/m ²	120min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL	90min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min				
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

総コース数: 2コース




レジメン登録名: FP(700/70)
 登録番号: 食道-03
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day 1-5				側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 700mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
				Rp.3	生食	500mL	90min
				Rp.4	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬 アロカリス	100mL 9.9mg 1A 1V	15min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m ²	120min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール



レジメン登録名: FP(700/70)+CRT
 登録番号: 食道-04
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: Stage I(T1N0M0)

① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-4				側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 700mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
				Rp.3	生食	500mL	90min
				Rp.4	生食 デキサート アロキシ アロカリス	100mL 9.9mg 1V 1V	15min
側管から Day 2-3							
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m ²	120min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.7	ソルデム3	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

総コース数: 2コース
 放射線: 2Gy/day / 15fra / 4wks




レジメン登録名: DOC
登録番号: 食道-05
対象癌種: 食道がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: wPAC
 登録番号: 食道-11
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1, 8, 15, 22, 29, 36			
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 100mg/m ²	60min


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与
1コース期間: 7週間




レジメン登録名: DOC+CDDP+5FU
 登録番号: 食道-12
 対象癌種: 食道がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day1-5				側管から Day1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750 mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
				Rp.3	生食	500mL	90min
				Rp.4	生食 デキサート 5HT ₃ 拮抗薬 アロカリス	100mL 9.9mg 1A 1V	30min
側管から Day2-5				側管から Day1			
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 70 mg/m ²	60min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 70 mg/m ²	120min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.8	ソルデム3	500mL	90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.9	ソルアセトF	500mL	90min

※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 食道-13
対象癌種: 食道がん
適応分類: がん化学療法後に増悪した
根治切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240 mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 食道-14
対象癌種: 食道がん
適応分類: がん化学療法後に増悪した
根治切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: FOLFOX+CRT
 登録番号: 食道-15
 対象癌種: 食道癌
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	※アプレピタント使用時はデキサートを4.95mgへ減量
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.3	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min	
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 1600mg/m ²	46hr	※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: 6コースまで
 放射線は50Gy/25回

レジメン登録名: FOLFOX
 登録番号: 食道-16
 対象癌種: 食道癌
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	※アプレピタント使用時はデキサートを4.95mgへ減量
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	
Rp.3	5% ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min	
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min	
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: Pembrolizumab+5FU+CDDP

登録番号: 食道-19

対象癌種: 食道がん

適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-5				側管から Day 1			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 800mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
				Rp.3	生食 硫酸Mg	500mL 20mL	90min
				Rp.4	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 デキサート	100mL 9.9mg	15min
Rp.3	ソルデム3号	500mL	90min		5-HT3拮抗薬 アロカリス	1A 1V	
Rp.4	ソルアセットF	500mL	90min	Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 80mg/m ²	120min
Rp.5	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.7	ソルアセットF	500mL	90min
Rp.6	ソルアセットF	500mL	90min	Rp.8	ソルデム3号	500mL	90min
				Rp.9	ソルアセットF	500mL	90min


臨床試験では、
 ※シスプラチンは最大6コース投与可
 ※キイトルーダ・5-FUは最大35サイクルまで投与

※シスプラチンは遮光して投与する
 ※Day1の5-FUはキイトルーダ終了後に開始する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivo(2週) + Ipi
 登録番号: 食道-21
 対象癌種: 食道癌
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 15, 29		
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240mg	30min	生食 Nivolumab	100mL 240mg	30min
Rp.2	生食	100mL	30min			
Rp.3	生食 Ipilimumab	20mL 1mg/kg	30min			


※フィルター付きルートを使用すること
 ※Ipilimumabは生食30mLを抜いてから必要量を混注すること
 (1-4mg/mLを確保するため)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間




レジメン登録名: Nivo(3週) + Ipi
 登録番号: 食道-22
 対象癌種: 食道癌
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 22		
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 360mg	30min	生食 Nivolumab	100mL 360mg	30min
Rp.2	生食	100mL	30min			
Rp.3	生食 Ipilimumab	20mL 1mg/kg	30min			


※フィルター付きルートを使用すること
 ※Ipilimumabは生食30mLを抜いてから
 必要量を混注すること
 (1-4mg/mLを確保するため)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間



レジメン登録名: Nivo+CDDP+5-FU
 登録番号: 食道-23
 対象癌種: 食道癌
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-5				側管から Day 1		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 800mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3号	500mL 90min
				Rp.3	生食 硫酸Mg	500mL 20mL 90min
				Rp.4	生食 オプジーボ	80mL 480mg 30min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.5	生食 デキサート 5-HT3拮抗薬 アロカリス	100mL 9.9mg 1A 1V 30min
Rp.3	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.6	フロセミド注	10mg ワンショット
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.7	生食 シスプラチン	300mL 80mg/m ² 120min
Rp.5	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.8	ソルアセトF	500mL 90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.9	ソルデム3号	500mL 90min
				Rp.10	ソルアセトF	500mL 90min

※臨床試験ではFPIは効果や認容性がなくなるまで投与。

※オプジーボはフィルター付きルートが必要
 ※シスプラチンは遮光して投与する
 ※Day1の5-FUはオプジーボ終了後に開始する（配合変化）

② 投与方法



③ 投与スケジュール

