


レジメン登録名: High dose MTX
 登録番号: 脳-01
 対象癌種: 中枢神経原発悪性リンパ腫
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2				Day 3-4			
Rp.1	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr	Rp.1	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr	Rp.1	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr
Rp.2	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr	Rp.2	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr	Rp.2	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr
Rp.3	ソルデム3 メイロン ファモチジン	500mL 40mL 20mg	4hr	Rp.3	ソルデム3 メイロン ファモチジン	500mL 40mL 20mg	4hr	Rp.3	生食 メイロン	1000mL 80mL	10hr
Rp.4	生食 メソトレキセート	500mL(total) 3.5g/m ²	3hr	Rp.4	生食 メイロン	1000mL 80mL	10hr	Day 5			
Rp.5	生食 メイロン	1000mL 80mL	10hr					Rp.1	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr
								Rp.2	ソルデム3 メイロン	500mL 40mL	5hr


※MTX投与開始24時間後から、3時間間隔で9回、引き続き6時間間隔で8回、ロイコボリン15mgを側管から静注する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2-3週間
 完遂後、放射線30Gy照射



※注意事項

- ・尿量が200mL/2hr以下の場合、ダイアモックス 500mg静注 (ラシックスは尿を酸性化させるため禁忌！)
- ・尿pH7.0以下の場合、メイロン 20mL静注
- ・口内炎発現時、ロイコボリン錠 15mgを100mLの水に溶解し、含嗽内服
- ・悪心発現時、5-HT3RAやプリンペラン処置
- ・前コース時に嘔気嘔吐発現した場合、次コースよりMTX施行前に5-HT3RA静注
- ・血中濃度測定: 投与開始後48時間で $1 \times 10^{-6}M$ 、72時間で $1 \times 10^{-7}M$ 以下を目標


レジメン登録名: 脳-02 BV
登録番号: 脳-2
対象癌種: 脳神経膠腫
適応分類: 進行・再発
使用期限:

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 アバスタチン	100mL 10mg/kg	90min

※2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間

