


レジメン登録名: GEM + CDDP
 登録番号: 膀-05
 対象癌種: 膀胱がん・腎盂尿管がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 2				Day 1, 8, 15				
Rp.1	ソルデム3	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min	
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg		
	硫酸Mg補正液	10mEq						
Rp.3	生食	100mL	15min		Rp.2	生食	100mL	30min
	デキサート	9.9mg				ジェムザール	1000mg/m ²	
	パロノセトロン	1V						
	アロカリス	1V						
Rp.4	生食	300mL	120min					
	シスプラチン	70mg/m ²						
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min					
Rp.6	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min					
※シスプラチンは遮光して投与する Day 3, 4								
Rp.1	生食	100mL	15min					
	デキサート	6.6mg						
Rp.2	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min					
Rp.4	ソルデム3	500mL	90min					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min					

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM
登録番号: 膀-06
対象癌種: 膀胱がん・腎盂尿管がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	6.6mg	
Rp.2	生食	100mL	30min
	ジェムザール	1000mg/m ²	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM+CBDCA
 登録番号: 膀-10
 対象癌種: 膀胱がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 8		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100 mL 9.9 mg 1 A	15 min	生食 デキサート	100 mL 6.6 mg	15 min
	※イメンド併用時はDEXを4.95mgへ減量する					
Rp.2	生食 カルボプラチン	250 mL AUC 4	60 min	生食 ジェムザール	100 mL 1000 mg/m ²	30 min
Rp.3	生食 ジェムザール	100 mL 1000 mg/m ²	30 min			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: U-Pembrolizumab
登録番号: 膀-13
対象癌種: 尿路上皮がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: U-Pembrolizumab(6週毎)
登録番号: 膀-14
対象癌種: 尿路上皮がん
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 400mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間



レジメン登録名: Avelumab
 登録番号: 膀-15
 対象癌種: 尿路上皮がん
 適応分類: 切除不能な進行・再発
 プラチナ抗癌剤投与後の維持療法

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ポララミン	50 mL 5 mg	15min
Rp.2	生食	100 mL	30min
Rp.3	生食 Avelumab	250 mL 10 mg/kg	120min


※Rp.3 開始45分前までにカロナール(500) 1T内服
 ※5コース目以降は患者の症状にあわせ前投薬の省略を考慮
 ※3コース目以降は患者の状況に合わせて60minまで短縮可
 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: Enfortumab Vedotin
 登録番号: 膀胱-16
 対象癌種: 尿路上皮癌
 適応分類: 進行・再発 3次治療以降


① 投与薬剤名と投与量

Day 1		
Rp.1	生食	100mL
Rp.2	生食 パドセブ	50mL 1.25mg/kg
		30min
Rp.3	生食	100mL

減量段階	投与量
通常投与量	1.25mg/kg (最大 125mg)
1 段階減量	1.0mg/kg (最大 100mg)
2 段階減量	0.75mg/kg (最大 75mg)
3 段階減量	0.5mg/kg (最大 50mg)

* 過去の治療でinfusion reaction歴のある患者では、
 前投薬に抗ヒスタミン薬、デキサメタゾンの使用を検討

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間

