


レジメン登録名: AP  
 登録番号: 子体-01  
 対象癌種: 子宮体がん  
 適応分類: 術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day1				Day2, 3			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	6.6mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
Rp.3	生食	100mL	全開	Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	ドキシソルビシン	60mg/m <sup>2</sup>		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min	Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>		Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				

※Day1からアプレピタントを3日間内服する  
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール



レジメン登録名:

DOC + CDDP

登録番号:

子体-03

対象癌種:

子宮体がん

適応分類:


術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day1				Day2,3	
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	30min		デキサート	6.6mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A		Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.3	生食	250mL	60min	Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	ドセタキセル	70mg/m <sup>2</sup>		Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m <sup>2</sup>					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				


※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間




レジメン登録名:	wPAC
登録番号:	子体-06
対象癌種:	子宮体がん
適応分類:	進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15, 22	
Rp.1	生食	50mL	10min
	デキサート	6.6mg	
	ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5mg	
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食	250mL	60min
	パクリタキセル	80mg/m <sup>2</sup>	


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名:

PAC + CDDP

登録番号:

子体-08

対象癌種:

子宮体がん

適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day1			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.2	生食	50mL	10min
	デキサート	9.9mg	
	ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5mg	
	アロカリス	1V	
Rp.3	生食	100mL	30min
	5-HT <sub>3</sub> 拮抗薬	1A	
Rp.4	生食	500mL	180min
	パクリタキセル	180mg/m <sup>2</sup>	
Rp.5	生食	300mL	120min
	シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.7	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min

※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

Day2, 3			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	6.6mg	
Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min


※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間




レジメン登録名: Pembro+Lenvatinib  
 登録番号: 子体-11  
 対象癌種: 子宮体癌  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法




レンビマ

減量段階基準	投与量(1日1回)	カプセル数
通常投与量	20mg	10mg×2 10mgカプセル×2
1段階減量	14mg	10mg×1 4mg×1 4mgカプセル×1 10mgカプセル×1
2段階減量	10mg	10mg×1 10mgカプセル×1
3段階減量	8mg	4mg×2 4mgカプセル×2
4段階減量	4mg	4mg×1 4mgカプセル×1

③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Pembro(6週毎)+Lenbatinib  
 登録番号: 子体-12  
 対象癌種: 子宮体癌  
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 400mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



レンビマ

減量段階基準	投与量(1日1回)	カプセル数
通常投与量	20mg	10mg×2 10mgカプセル×2
1段階減量	14mg	10mg×1 4mg×1 4mgカプセル×1 10mgカプセル×1
2段階減量	10mg	10mg×1 10mgカプセル×1
3段階減量	8mg	4mg×2 4mgカプセル×2
4段階減量	4mg	4mg×1 4mgカプセル×1

③ 投与スケジュール

1コース期間: 6週間

