


レジメン登録名: PAC + IFM + CDDP
 登録番号: 精巢-02
 対象癌種: 胚細胞腫瘍
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day1		メインルート Day 2-5		側管から Day 2-5	
Rp.1	生食 100mL 10min ファモチジン20mg デキサート 16.5mg ※パクリタキセル点滴30分前にベナ5錠内服。もしくはRp1にポラミン注5mg追加。	Rp.1	生食 100mL 15min デキサート 9.9mg 5HT3RA 1A	Rp.2	生食 20mL ウロミテキサン 500mg/m ² ※イホマイド開始と同時に開始
Rp.2	生食 100mL 30min	Rp.3	生食 500mL 90min イホマイド 1500mg/m ²	Rp.6	生食 20mL ウロミテキサン 500mg/m ² ※Rp.7開始と同時に開始
Rp.3	生食 500mL 3hr パクリタキセル250mg/m ²	Rp.4	生食 500mL 2hr シスプラチン 25mg/m ²	Rp.10	生食 20mL ウロミテキサン 500mg/m ² ※Rp.11開始と同時に開始
※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する		Rp.5	ソルアセトF 500mL 90min メイロン 20mL	※必要に応じて、ウロミテキサンやマンニトールの追加を考慮する ※尿のアルカリ化をはかる。 必要に応じてメイロンを追加。	
		Rp.7	ソルデム3 500mL 90min メイロン 20mL		
		Rp.8	20%マンニトール 300mL 60min		
		Rp.9	ソルアセトF 500mL 90min メイロン 20mL		
		Rp.11	ソルデム3 500mL 90min メイロン 20mL		

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

