


レジメン登録名: Temsirolimus  
登録番号: 腎-02  
対象癌種: 腎がん  
適応分類: 切除不能又は  
転移性腎がん

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ポラミン	50 mL 5 mg	10min
Rp.2	生食	100 mL	30min
Rp.3	生食 トーリセル	250 mL 25 mg/body	60min


※トーリセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる  
※トーリセル投与時には0.22 $\mu$ m以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 1週間




レジメン登録名: R-Nivolumab  
登録番号: 腎-03  
対象癌種: 腎癌  
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 3 mg/kg	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: R-Nivolumab + Ipilimumab  
 登録番号: 腎-04  
 対象癌種: 腎癌  
 適応分類: IMDCリスク  
 Intermediate/Poorの1次治療

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1			
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240mg	30min		※フィルター付きルートを使用すること
Rp.2	生食	100mL	30min		
Rp.3	生食 Ipilimumab	20mL 1mg/kg	30min		※Ipilimumabは生食30mLを抜いてから 必要量を混注すること (1-4mg/mLを確保するため)

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: R-Nivolumab(4週毎)  
登録番号: 腎-05  
対象癌種: 腎癌  
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: Pembro+Axitinib  
 登録番号: 腎-06  
 対象癌種: 腎癌  
 適応分類: 切除不能

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Pembrolizumab	100mL 200mg/body	30min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



<参考: アキシチニブの用量レベルと増量方法>

国際共同第Ⅲ相試験 (KEYNOTE-426試験) 時に規定されていた以下の減量及び増量における用量レベルと増量方法を参考にしてください。

用量レベル	用量
+2	10mg 1日2回投与 <sup>*7</sup>
+1	7mg 1日2回投与 <sup>*7</sup>
開始用量	5mg 1日2回投与
-1	3mg 1日2回投与
-2	2mg 1日2回投与

<sup>\*7</sup>: 5mg 1日2回、連続2コース(6週間)以上の忍容が可能であり、Grade 2を超える副作用が認められず、血圧が150/90mmHg以下にコントロールされている場合、7mg 1日2回の増量が可能。また同様の基準を用い、10mg 1日2回の増量が可能。