


レジメン登録名: AP
 登録番号: 子体-01
 対象癌種: 子宮体がん
 適応分類: 術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day1				Day2, 3			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	6.6mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.3	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	生食	100mL	全開	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	ドキシソルビシン	60mg/m ²		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	生食	300mL	120min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.5	シスプラチン	50mg/m ²					
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.7	ソルデム3号	500mL	90min				
	ソルアセトF	500mL	90min				

※Day1からアプレピタントを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール



レジメン登録名:

DOC + CDDP

登録番号:

子体-03

対象癌種:

子宮体がん

適応分類:


術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day1				Day2,3	
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	100mL	15min		デキサート	6.6mg	
	デキサート	9.9mg			5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.3	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	生食	250mL	60min	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	ドセタキセル	70mg/m ²		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				


※Day1からイメンドを3日間で内服する
※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間



レジメン登録名:

wPAC

登録番号:

子体-06

対象癌種:

子宮体がん

適応分類:


進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15, 22	
Rp.1	生食	50mL	10min
	デキサート	6.6mg	
	ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5mg	
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食	250mL	60min
	パクリタキセル	80mg/m ²	


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名:

PAC + CDDP

登録番号:

子体-08

対象癌種:

子宮体がん

適応分類:

術後・進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day1				Day2, 3			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.2	生食	50mL	10min				
	デキサート	9.9mg					
	ファモチジン	20mg					
	ポララミン	5mg					
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.1	生食	100mL	15min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A			デキサート	6.6mg	
Rp.4	生食	500mL	180min				
	パクリタキセル	180mg/m ²		Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.5	生食	300mL	120min	Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	シスプラチン	50mg/m ²		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.7	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min				

※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

※Day1からアプレピタントを3日間内服する
※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間

