


レジメン登録名: DOC + CDDP + 5FU
 登録番号: 頭頸-01
 対象癌種: 頭頸部がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


メインルート Day 1-5				側管から Day 5-6				側管から Day 4			
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 750mg/m ²	24hr					Rp.2	ソルデム3	500mL	90min
								Rp.3	生食	500mL	90min
								Rp.4	生食 デキサート	100mL 9.9mg	15min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min					Rp.5	生食 ドセタキセル	250mL 60mg/m ²	60min
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min					Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 70mg/m ²	120min
Rp.4	ヴィーンF	500mL	90min					Rp.7	ヴィーンF	500mL	90min
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min					Rp.8	ソルデム3	500mL	90min
Rp.6	ヴィーンF	500mL	90min					Rp.9	ヴィーンF	500mL	90min

※Day4からイメンドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する
 ※ジラスタを5-FU終了後24hのday7に投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: DOC + CDDP + 5FU + CRT
 登録番号: 頭頸-02
 対象癌種: 頭頸部がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-5				側管から Day 4		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 600mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3	500mL 90min
				Rp.3	生食	500mL 90min
				Rp.4	生食 デキサート	100mL 15min 9.9mg
				Rp.5	5-HT ₃ 拮抗薬 生食	1A 250mL 60min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.6	ドセタキセル	50mg/m ²
Rp.3	ソルデム3	500mL	90min	Rp.7	生食	300mL 120min
Rp.4	ヴィーンF	500mL	90min	Rp.8	シスプラチン	60mg/m ²
Rp.5	ソルデム3	500mL	90min	Rp.9	ヴィーンF	500mL 90min
Rp.6	ヴィーンF	500mL	90min			


※Day4からイメンドを3日間内服する
 ※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

RT: 60-66Gy/30-33fr




レジメン登録名: DOC
登録番号: 頭頸-03
対象癌種: 頭頸部がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: wPAC+Cet
 登録番号: 頭頸-12
 対象癌種: 頭頸部がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15, 22, 29, 36, 42			
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 16.5mg 5mg	10min	Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 16.5mg 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min	Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 アービタックス	500mL 400mg/m ²	2hr	Rp.3	生食 アービタックス	250mL 250mg/m ²	1hr
Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	1hr	Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	1hr

※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する


※Day42はRp4なし

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与
 1コース期間: 7週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 頭頸-15
対象癌種: 頭頸部がん
適応分類: 切除不能な進行・再発
※プラチナ使用歴ある患者

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 240 mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: 5FU+CDDP+Cet

登録番号: 頭頸-16


対象癌種: 頭頸部がん

適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

メインルート Day 1-4				側管から Day 1		
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 1000mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3号	500mL 90min
側管から Day 2-3				Rp.3	生食 デキサート ポララミン	50mL 9.9mg 1A 10min
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.4	生食 5-HT3拮抗薬	100mL 1A 30min
Rp.3	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.5	生食 アービタックス	初回 生食400mL+400mg/m ² 2回目以降 生食250mL+250mg/m ² 120min 60min
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.6	生食 シスプラチン	300mL 100mg/m ² 120min
Rp.5	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.7	ソルアセトF	500mL 90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.8	ソルデム3号	500mL 90min
メインルート Day 8,15				Rp.9	ソルアセトF	500mL 90min
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 6.6mg 1A	10min	※Day 1からイメドを3日間内服する ※シスプラチンは遮光して投与する		
Rp.2	生食	100mL	30min			
Rp.3	生食 アービタックス	250mL 250mg/m ²	60min			

② 投与方法



③ 投与スケジュール



レジメン登録名: Pembrolizumab+5FU+CDDP

登録番号: 頭頸-17

対象癌種: 頭頸部がん

適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

	メインルート Day 1-4			側管から Day 1	
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 1000mg/m ²	24hr	Rp.2	ソルデム3号 500mL 90min
		側管から Day 2-3		Rp.3	生食 500mL 90min 硫酸Mg 20mL
Rp.2	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	Rp.4	生食 キイトルーダ 100mL 30min 200mg
Rp.3	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.5	生食 デキサート 100mL 15min 9.9mg 5-HT3拮抗薬 1A
Rp.4	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.6	生食 シスプラチン 300mL 120min 100mg/m ²
Rp.5	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.7	ソルアセトF 500mL 90min
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min	Rp.8	ソルデム3号 500mL 90min
				Rp.9	ソルアセトF 500mL 90min


※Day 1からイメンドを3日間内服する
※シスプラチンは遮光して投与する

② 投与方法

※キイトルーダ・シスプラチンは最大6コース投与可
※それ以降はキイトルーダ維持療法へ



③ 投与スケジュール




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 頭頸-19
対象癌種: 頭頸部がん
適応分類: 切除不能な進行・再発
※プラチナ使用歴ある患者

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: Pembrolizumab+5FU+CBDCA

登録番号: 頭頸-20

対象癌種: 頭頸部がん


適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		メインルート Day 1-4	
Rp.1	生食 5-FU	1000mL 1000mg/m ²	24hr
		側管から Day 1	
Rp.2	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 5	60min

※Day 1からイメンドを3日間で内服する
※キイトルーダ・カルボプラチンは最大6コース投与可
※それ以降はキイトルーダ維持療法へ

② 投与方法



③ 投与スケジュール

