


レジメン登録名: EC
 登録番号: 乳-02
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 術前・術後・再発転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬 アロカリス	100mL 6.6mg 1A 1V	30min	
Rp.2	生食 ファルモルビシンRTU デキサート	20mL 90mg/m ² 3.3mg	全開	※生食100mLから80mL抜き取る
Rp.3	生食 エンドキサン	250mL 600mg/m ²	30min	Day 2-4の間にジーラスタ投与

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wHER
登録番号: 乳-06
対象癌種: 乳がん
適応分類: 術前・術後・転移再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min ※初回はRp.1を投与30分前にカロナール2錠を内服

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC
 登録番号: 乳-07
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 術前・術後・再発転移

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15	
Rp.1	生食 デキサート ガスター ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与
 1コース期間: 3週間




レジメン登録名: DOC(75)
登録番号: 乳-14
対象癌種: 乳がん
適応分類: 術前・術後・再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 75mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: 3-wNabP
登録番号: 乳-19
対象癌種: 乳がん
適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 260mg/m ²	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: wPAC+PER+3-wHER
 登録番号: 乳-28
 対象癌種: HER2陽性乳がん
 適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1			Day 8,15
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	60min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.3	生食 デキサート ファモチジン ボララミン	50mL 6.6mg 1A 5mg	10min	○
Rp.4	生食	100mL	30min	○
Rp.5	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min	○


※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服
 ※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: DOC(75)+PER+3-wHER
 登録番号: 乳-29
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可 ※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.4	生食 ドセタキセル	250mL 75mg/m ²	60min

② 投与方法




③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: T-DM1
登録番号: 乳-30
対象癌種: 乳がん
適応分類: HER2陽性の
手術不能又は再発乳癌

① 投与薬剤名と投与量




② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: HAL+PER+3-wHER
 登録番号: 乳-33
 対象癌種: HER2陽性乳がん
 適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 8
Rp.1	生食 パージェタ	250mL 840mg(初回) 420mg(2回目以降)	60min 2回目以降は30minに短縮可	×
Rp.2	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	90min 2回目以降は30minに短縮可 ※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服	×
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	○
Rp.4	生食 ハラヴェン	20mL 1.4mg/m ²	2~5分	○

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: PER+3-wHER
 登録番号: 乳-34
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 術前・術後補助

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食	250mL	60min
	パージェタ	840mg(初回) 420mg(2回目以降)	2回目以降は30minに短縮可
Rp.2	生食	250mL	90min
	ハーセプチン	8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目以降)	2回目以降は30minに短縮可


※初回はRp.2の投与30分前にカロナール2錠を内服

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Atezolizumab + wNabP
登録番号: 乳-35
対象癌種: 乳がん
適応分類: 再発・転移

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	
Rp.2	生食 アブラキサン	必要量 260mg/m ²	30min	※アブラキサンの濃度は5mg/mL厳守とする。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: T-Deruxtecan
 登録番号: 乳-37
 対象癌種: 乳癌
 適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100 mL 9.9 mg 1 A	15min	
Rp.2	5% Tz T-Deruxtecan	100mL 5.4 mg/kg	90min	※イメンド追加の場合はデキサート4.95mg ※2回目以降は30分まで短縮可能 ※フィルター付きルートを使用すること ※要遮光

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: Pembro+wPAC+CBDCA

登録番号: 乳-40


対象癌種: 乳癌

適応分類: 術前補助化学療法

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1				Day 8, 15	
Rp.1	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min	Rp.1	生食 デキサート	50mL 6.6mg	10min
Rp.2	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min	Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min
Rp.4	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する ※Day1からアプレピタントを3日間内服する			
Rp.5	生食 カルボプラチン	250mL 5AUC	60min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: Pembro+EC
 登録番号: 乳-41
 対象癌種: 乳癌
 適応分類: 術前補助化学療法


① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 キイトルーダ	100mL 200mg	30min
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬 アロカリス	100mL 6.6mg 1A 1V	15min
Rp.3	生食 エピルビシン デキサート	20mL 90mg/m ² 3.3mg	全開
Rp.4	生食 エンドキサン	250mL 600mg/m ²	30min

※生食100mLから80mL抜き取る


Day 3にジーラスタ投与

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: フェスコ
 登録番号: 乳-44
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 術前・術後補助・進行再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	フェスコ	IN 15mL(初回) MA 10mL(2回目以降)	初回 8分 皮下注射 2回目以降 5分 皮下注射
Rp.2	観察時間		初回 30分 2回目以降 15分

※初回投与時にカロナールが必要かどうか確認中
 ※前回投与より6週間以上間隔があいたら初回量

② 投与方法 初回:1時間 2コース目以降:30分



③ 投与スケジュール 1コース期間: 3週間




レジメン登録名: DOC(75)+フェスゴ[®]
 登録番号: 乳-45
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 術前・術後補助・進行再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	フェスゴ	IN 15mL(初回) MA 10mL(2回目以降)	初回 8分 皮下注射 2回目以降 5分 皮下注射
Rp.2	観察時間		初回 30分 2回目以降 15分
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.4	生食 ドセタキセル	250mL 75mg/m ²	60min


② 投与方法

初回:2時間 2コース目以降:1時間30分



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: HAL+フェスゴ
 登録番号: 乳-46
 対象癌種: 乳がん
 適応分類: 進行再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 8
Rp.1	フェスゴ	IN 15mL(初回) MA 10mL(2回目以降)	初回 8分 皮下注射 2回目以降 5分 皮下注射	×
Rp.2	観察時間		初回 30分 2回目以降 15分	×
Rp.3	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	○
Rp.4	生食 ハラヴェン	20mL 1.4mg/m ²	2~5分	○

② 投与方法

Day1 初回:1時間 2コース目以降:40分(約1時間)



Day8 30分



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

