

レジメン登録名: S-1 + CDDP
 登録番号: 胃-01
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 8				Day 9, 10			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する

Day 1 - 21


S-1	BSA	
	1.25m ² 未満	80mg/body/day
	1.25-1.5m ²	100mg/body/day
	1.5m ² 以上	120mg/body/day

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間




レジメン登録名: S-1 + DOC
 登録番号: 胃-02
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1			Day 1 - 14		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	S-1	BSA 1.25m ² 未満 1.25-1.5m ² 1.5m ² 以上	80mg/body/day 100mg/body/day 120mg/body/day
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 40mg/m ²	60min			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: S-1 + PAC
 登録番号: 胃-03
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1,8			Day 1 - 14		
Rp.1	生食	50mL	10min	S-1	BSA	
	デキサート	6.6mg			1.25m ² 未満	80mg/body/day
	ファモチジン	20mg			1.25-1.5m ²	100mg/body/day
	※パクリタキセル点滴30分前にペナ5錠内服 またはRp.1にポララミン 5mg追加				1.5m ² 以上	120mg/body/day
Rp.2	生食	100mL	30min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する		
Rp.3	生食	250mL	60min			
	パクリタキセル	50mg/m ²				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: S-1 + CPT-11
 登録番号: 胃-15
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1, 15			Day 1 - 21		
Rp.1	生食	100mL	15min	S-1	BSA	
	デキサート	9.9mg			1.25m ² 未満	80mg/body/day
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A			1.25-1.5m ²	100mg/body/day
Rp.2	生食	500mL	90min		1.5m ² 以上	120mg/body/day
	トポテシン	80mg/m ²				
	※遮光して投与する					

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 5週間



レジメン登録名: Cape + CDDP
 登録番号: 胃-24
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 2.3			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	80mg/m ²					
Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.6	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.7	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する
 ※Day1からイメンドを3日間内服する。

Day 1 - 14

ゼローダ 2000mg/m²/day
 1日2回


体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²			
1.41~1.51m ²	3000	2400	1800
1.51~1.66m ²			
1.66~1.81m ²	3600	3000	2400
1.81~1.96m ²			
1.96~2.11m ²	4200	3000	2400
2.11m ² 以上			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: CapeOX
 登録番号: 胃-27
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 ※イモンド併用時はデキサートを4.95mgへ減量する	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	ゼローダ 2000mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		


② 投与方法



体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²			
1.41~1.51m ²	3000	2400	1800
1.51~1.66m ²			
1.66~1.81m ²	3600	3000	1800
1.81~1.96m ²			
1.96~2.11m ²	4200	3000	1800
2.11m ² 以上			

③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: G-SOX
 登録番号: 胃-29
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-14 内服													
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 ※イモド併用時はデキサートを4.95mgへ減量する	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	TS-1 80mg/m ² /day 1日2回												
Rp.2	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 100mg/m ²	2hr	<table border="1"> <tr> <td colspan="3">TS-1投与量</td> </tr> <tr> <td>BSA</td> <td>1.25m²未満</td> <td>80mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.25-1.5m²</td> <td>100mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5m²以上</td> <td>120mg/body</td> </tr> </table>		TS-1投与量			BSA	1.25m ² 未満	80mg/body		1.25-1.5m ²	100mg/body		1.5m ² 以上	120mg/body
TS-1投与量																	
BSA	1.25m ² 未満	80mg/body															
	1.25-1.5m ²	100mg/body															
	1.5m ² 以上	120mg/body															

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間:3週間



レジメン登録名: wPAC+RAM
 登録番号: 胃-31
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発
 使用期限:

① 投与薬剤名と投与量

	Day 1,15				Day 8		
Rp.1	生食	50mL	10min	Rp.1	生食	50mL	10min
	デキサート	6.6mg			デキサート	6.6mg	
	ファモチジン	20mg			ファモチジン	20mg	
	ポララミン	5mg			ポララミン	5mg	
Rp.2	生食	100mL	30min	Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食	250mL	60min	Rp.3	生食	250mL	60min
	サイラムザ	8mg/kg			パクリタキセル	80mg/m ²	
Rp.4	生食	250mL	60min				
	パクリタキセル	80mg/m ²					

※サイラムザとパクリタキセルの間に1時間の観察期間をもうけること
 (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)

※サイラムザ、パクリタキセル投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する


② 投与方法

※RAVIはDay1,15のみ



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間 PDまで



レジメン登録名: G-DCS
 登録番号: 胃-33
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

Day 8				Day 9, 10			
Rp.1	ソルデム3号	500mL	90min	Rp.1	生食	100mL	15min
Rp.2	生食	500mL	90min		デキサート	6.6mg	
Rp.3	生食	100mL	30min	Rp.2	ソルデム3号	500mL	90min
	デキサート	9.9mg		Rp.3	ソルアセトF	500mL	90min
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		Rp.4	ソルデム3号	500mL	90min
	アロカリス	1V		Rp.5	ソルアセトF	500mL	90min
Rp.4	生食	300mL	60min				
	ドセタキセル	60mg/m ²					
Rp.5	生食	300mL	120min				
	シスプラチン	60mg/m ²					
Rp.6	ソルアセトF	500mL	90min				
Rp.7	ソルデム3号	500mL	90min				
Rp.8	ソルアセトF	500mL	90min				

※シスプラチンは遮光して投与する


Day 1 - 14			
S-1	BSA		
	1.25m ² 未満	80mg/body/day	
	1.25-1.5m ²	100mg/body/day	
	1.5m ² 以上	120mg/body/day	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 胃-34
対象癌種: 胃癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 3 mg/kg	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 2週間



レジメン登録名: wNabP+RAM
 登録番号: 胃-35
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発
 使用期限:


① 投与薬剤名と投与量

	Day 1,15				Day 8		
Rp.1	生食	50mL	10min	Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	6.6mg			デキサート	6.6mg	
	ポララミン	5mg		Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.2	生食	100mL	30min		アブラキサン	100mg/m ²	
Rp.3	生食	250mL	60min				
	サイラムザ	8mg/kg					
Rp.4	生食	100mL	30min				
	アブラキサン	100mg/m ²					

サイラムザとアブラキサンの間に1時間の観察期間をもうけること
 (Infusion reactionの発現がなければ、サイクル3以降は省略可)


※サイラムザ投与時はDEHPを含まない、0.22μm以下のメンブランフィルターを有するインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間 PDまで



レジメン登録名: G-SOX + HER
 登録番号: 胃-36
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: HER2陽性の進行・再発


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 ハーセプチン	250mL 8mg/kg(初回) 6mg/kg(2回目移行)	90min	Rp.1	TS-1 80-120mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		

TS-1投与量


BSA	1.25m ² 未満	80mg/body
	1.25-1.5m ²	100mg/body
	1.5m ² 以上	120mg/body

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: G-T-Deruxtecan
登録番号: 胃-38
対象癌種: 胃癌
適応分類: 切除不能な進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1	
Rp.1	生食	100 mL	15min
	デキサート	9.9 mg	
	5-HT ₃ 拮抗剤	1 A	
Rp.2	5% Tz	100 mL	90min
	T-Deruxtecan	6.4 mg/kg	


※アプレピタント追加の場合はデキサート4.95mg
※2回目以降は30分まで短縮可能
※フィルター付きルートを使用すること
※要遮光

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Nivolumab
登録番号: 胃-39
対象癌種: 胃癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1	
Rp.1	生食 Nivolumab	100mL 480mg/body	60min以上 ※フィルター付きルートを使用すること

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間



レジメン登録名: Nivo+G-SOX
 登録番号: 胃-41
 対象癌種: 胃癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療


① 投与薬剤名と投与量

		Day 1		Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 オブジーボ	100mL 360mg	30min	Rp.1	TS-1 80mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食	100mL	30min		
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		※アプレピタント併用時はデキサートを4.95mgへ減量する ※フィルター付きルートを使用すること
Rp.4	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		

TS-1投与量


BSA	1.25m ² 未満	80mg/body
	1.25-1.5m ²	100mg/body
	1.5m ² 以上	120mg/body

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: Nivo+CapeOX
 登録番号: 胃-42
 対象癌種: 胃癌
 適応分類: 進行・再発の1次治療

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 1-14 内服	
Rp.1	生食 オブジーボ	100mL 240mg	30min	Rp.1	Cape 2000mg/m ² /day 1日2回
Rp.2	生食	100mL	30min		
Rp.3	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤	100mL 9.9mg 1A	15min		※アプレピタント併用時はデキサートを4.95mgへ減量する ※フィルター付きリートをを使用すること
Rp.4	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr		


体表面積	Capecitabine (1日用量)		
	初回投与量	減量段階1	減量段階2
1.36m ² 未満	2400	1800	1200
1.36~1.41m ²	3000		
1.41~1.51m ²		2400	
1.51~1.66m ²			1800
1.66~1.81m ²	3600		
1.81~1.96m ²		3000	
1.96~2.11m ²	4200		2400
2.11m ² 以上			

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: mFOLFOX6
 登録番号: 胃-43,44
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 1 アレルギーレジメン			
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート ポラミン	50mL 16.5mg 5mg	10min
※アプレピタント併用時はデキサートを4.95mgへ減量する				※アプレピタント併用時はデキサートを9.9mgへ減量する			
Rp.2	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min	Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	250mL 85mg/m ²	120min
Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min	Rp.4	5-FU	400mg/m ²	3min
Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	Rp.5	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr

※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール



48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで


レジメン登録名: Nivo+mFOLFOX6
 登録番号: 胃-45,46
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				Day 1 アレルギーレジメン			
Rp.1	生食 オブジーボ	100mL 240mg	30min	Rp.1	生食 オブジーボ	100mL 240mg	30min
Rp.2	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.2	生食 デキサート ポラミン	50mL 16.5mg 5mg	10min
※アプレピタント併用時はデキサートを4.95mgへ減量する				※アプレピタント併用時はデキサートを9.9mgへ減量する			
Rp.3	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min	Rp.3	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min
Rp.4	5%ブドウ糖液 エルブラット	250mL 85mg/m ²	120min	Rp.4	生食 レボホリナート	250mL 200mg/m ²	120min
Rp.5	5-FU	400mg/m ²	3min	Rp.5	5%ブドウ糖液 エルブラット	250mL 85mg/m ²	120min
Rp.6	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr	Rp.6	5-FU	400mg/m ²	3min
				Rp.7	生食 5-FU (c.i.)	適量 2400mg/m ²	46hr

※Rp.5はインフューザーポンプを使用

② 投与方法



③ 投与スケジュール




48時間投与
 1コース期間: 2週間
 総コース数: PDまで

レジメン登録名: G-SOX
 登録番号: 胃-47
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		Day 1-14 内服													
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗剤 ※アプレピタント併用時はデキサートを4.95mgへ減量する	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	TS-1 80mg/m ² /day 1日2回												
Rp.2	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">TS-1投与量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>BSA</td> <td>1.25m²未満</td> <td>80mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.25-1.5m²</td> <td>100mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5m²以上</td> <td>120mg/body</td> </tr> </tbody> </table>		TS-1投与量			BSA	1.25m ² 未満	80mg/body		1.25-1.5m ²	100mg/body		1.5m ² 以上	120mg/body
TS-1投与量																	
BSA	1.25m ² 未満	80mg/body															
	1.25-1.5m ²	100mg/body															
	1.5m ² 以上	120mg/body															

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: G-SOX(アレルギー対策)
 登録番号: 胃-48
 対象癌種: 胃がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 1-14 内服														
Rp.1	生食 デキサート ポララミン	50mL 16.5mg 5mg	10min	Rp.1	TS-1	80mg/m ² /day 1日2回												
※アプレピタント併用時はデキサートを9.9mgへ減量する																		
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">TS-1投与量</th> </tr> <tr> <td>BSA</td> <td>1.25m²未満</td> <td>80mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.25-1.5m²</td> <td>100mg/body</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.5m²以上</td> <td>120mg/body</td> </tr> </table>			TS-1投与量			BSA	1.25m ² 未満	80mg/body		1.25-1.5m ²	100mg/body		1.5m ² 以上	120mg/body
TS-1投与量																		
BSA	1.25m ² 未満	80mg/body																
	1.25-1.5m ²	100mg/body																
	1.5m ² 以上	120mg/body																
Rp.3	5%ブドウ糖液 エルプラット	500mL 130mg/m ²	2hr															

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間:3週間

