

レジメン登録名:

3-wPAC+CBDCA

登録番号:

卵巣-01

対象癌種:

卵巣がん

適応分類:


術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1			
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	500mL 180mg/m ²	180min
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 6	60min


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名:

DOC + CBDCA

登録番号:

卵巣-02

対象癌種:

卵巣がん

適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day1			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	9.9mg	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.2	生食	250mL	60min
	ドセタキセル	60mg/m ²	
Rp.3	生食	250mL	60min
	カルボプラチン	AUC 6	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3 週間



レジメン登録名：
登録番号：
対象癌種：
適応分類：


wPAC
卵巣-08
卵巣がん
術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1, 8, 15, 22	
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 1A 5mg	10min
Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

毎週投与
1コース期間： 4週間



レジメン登録名:

wCPT-11

登録番号:

卵巣-09

対象癌種:

卵巣がん


適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食	100mL	15min	
	デキサート	9.9mg		
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A		
Rp.2	生食	500mL	90min	※トポテシンは遮光して投与する
	トポテシン	100mg/m ²		

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: DOC
登録番号: 卵巣-11
対象癌種: 卵巣がん
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ドセタキセル	250mL 70mg/m ²	60min

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: ddPAC + CBDCA
 登録番号: 卵巣-13
 対象癌種: 卵巣がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

Day 1				Day 8, 15			
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 9.9mg 20mg 5mg	10min	Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 6.6mg 20mg 5mg	10min
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	Rp.2	生食	100mL	30min
Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min	Rp.3	生食 パクリタキセル	250mL 80mg/m ²	60min
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL 6AUC	60min				


※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる
 ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間




レジメン登録名: PLD
 登録番号: 卵巣-15
 対象癌種: 卵巣がん
 適応分類: 進行・再発、2nd line以降

① 投与薬剤名と投与量


		Day 1		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	※ドキシル 90mg/body未満では、5%ブドウ糖液250mLで、90mg/body以上であれば5%ブドウ糖液500mLで溶解する。
Rp.2	5%ブドウ糖液 ドキシル	250mL 50mg/m ²	90min	
Rp.3	生食	100mL	30min	※ドキシル投与後は生食でフラッシュするが インフュージョンリアクションを懸念して30分かけて投与。

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間




レジメン登録名: GEM+CBDCA
 登録番号: 卵巣-17
 対象癌種: 卵巣がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


	Day 1				Day 8		
Rp.1	生食 デキサート 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 9.9mg 1A	15min	Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min
Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min	Rp.2	生食 ジェムザール	100mL 1000mg/m ²	30min
Rp.3	生食 カルボプラチン	250mL AUC 4	60min				

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間 コース数: 6



レジメン登録名:

3-wPAC+ CBDCA + BV

登録番号:

卵巣-18

対象癌種:

卵巣がん


適応分類:

術後・進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1				
Rp.1	生食 デキサート ファモチジン ポララミン	50mL 16.5mg 20mg 5mg	10min	
Rp.2	生食 5-HT ₃ 拮抗薬	100mL 1A	30min	
Rp.3	生食 パクリタキセル	500mL 175mg/m ²	180min	※パクリタキセルはDEHPを含まない輸液セットを用いる ※パクリタキセル投与時には0.22μm以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを使用する
Rp.4	生食 カルボプラチン	250mL AUC 6	60min	
Rp.5	生食 アバスタチン	100mL 15mg/kg	90min	※初回は90分で点滴 2回目は60分 3回目は30分に短縮可能

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間



レジメン登録名: PLD+CBDCA
 登録番号: 卵巣-20
 対象癌種: 卵巣がん
 適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量


Day 1			
Rp.1	生食	100mL	15min
	デキサート	9.9mg	
	5-HT ₃ 拮抗薬	1A	
Rp.2	5%ブドウ糖液	250mL	60min
	ドキシル	30mg/m ²	
Rp.3	生食	250mL	60min
	カルボプラチン	AUC 5	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 4週間 コース数: 6




レジメン登録名: NGT
登録番号: 卵巣-21
対象癌種: 卵巣癌
適応分類: 進行・再発

① 投与薬剤名と投与量

		Day 1 - 5		
Rp.1	生食 デキサート	100mL 6.6mg	15min	※Day2以降デキサートは減量可能
Rp.2	生食 ハイカムチン	100mL 1.5mg/m ²	30min	

② 投与方法



③ 投与スケジュール

1コース期間: 3週間

