

サルタノールインヘラーチェックシート

発作時に 1回 吸入
発作が治まらないときは、20分ごとに3回吸入し、
3回吸入しても効果が見られないときは病院へ

	指導	確認項目	チェック	
準備	<input type="checkbox"/>	吸入口のキャップをはずしましたか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	容器をよく振っていますか？	はい	いいえ
吸入	<input type="checkbox"/>	アルミ缶の底が上になるように持っていますか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	薬剤を吸入する前に息をはき出していますか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	息を吸い始めると同時にポンペをしっかり確実に1回押し、 薬をゆっくり深く吸い込んでいますか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	吸入後、息をとめていますか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	吸入回数を守っていますか？	はい	いいえ
保管	<input type="checkbox"/>	室温（日光・高温を避けて）で保管していますか？	はい	いいえ
	<input type="checkbox"/>	吸入口は時々水で洗浄していますか？	はい	いいえ

- 注意事項
- ① 発作止めのため、必ず手の届くところへ保管してください。
 - ② 吸入口は、使用後はきれいにふき取るようにしてください。
 - ③ 頻繁に使用されていない場合は、使用期限を確認してください。

コメント欄